

Durant la troisième décade d'avril, les conditions seront favorables à une augmentation du fond infectieux de plusieurs maladies fongiques.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 22.04.2023 Брой: 4/2023



Au cours de la période de sept jours à venir, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par un temps variable avec des précipitations fréquentes, ce qui maintiendra un très bon niveau de réserves en humidité du sol dans la couche de 50 cm et de bonnes conditions pour la végétation des cultures d'automne et des cultures de printemps nouvellement semées. Les précipitations importantes tombées pendant les première et deuxième décades d'avril dans la plupart des régions du pays ont dépassé les normes mensuelles (Vidin - 61 l/m², Vratsa - 84 l/m², Veliko Tarnovo - 74 l/m², Razgrad - 103 l/m², Silistra - 77 l/m², Shumen - 86 l/m², Dobrich - 80 l/m², Haskovo - 77 l/m², Kardzhali - 60 l/m², Elhovo - 91 l/m², Stara Zagora - 77 l/m², Karnobat - 68 l/m²) et ont

amélioré les réserves d'humidité dans les couches plus profondes du sol. À la fin de la deuxième décennie, dans la plupart des zones de plein champ, les réserves en humidité du sol dans la couche de 50 cm pour les céréales d'hiver ont atteint des niveaux supérieurs à 80-85% de la capacité au champ.

La plupart des jours de la période à venir, le développement des cultures agricoles se poursuivra à un rythme modéré, avec des températures proches des normes climatiques, et légèrement inférieures à la fin de la période. Pendant cette période, le blé sera principalement au stade de l'élongation des tiges, et pour l'orge, dans certains endroits de la plaine du Danube (station agrométéorologique de Novachene), le début de l'épiaison sera également observé. Le colza d'hiver sera principalement au stade de la floraison. Dans les peuplements de tournesol et de maïs, selon les dates de semis, on observera la levée et la formation des feuilles.

Dans le nord-central et le nord-ouest de la Bulgarie, en raison des pluies prolongées et des conditions climatiques défavorables, les semis sont à nouveau retardés. Les producteurs ont sécurisé les semences nécessaires, les parcelles ont été préparées et, dans des conditions favorables, les agriculteurs sont prêts à semer à la première occasion. Les surfaces semées jusqu'à présent sont très faibles par rapport à la même période des années précédentes.

Les précipitations fréquentes prévues pendant la troisième décennie d'avril créeront des conditions propices à une augmentation de la pression d'infection par un certain nombre de maladies fongiques : la septoriose et la rouille des feuilles chez les céréales d'hiver ; chez les arbres fruitiers – la pourriture brune précoce (fleur), la criblure, la cloque du pêcher, la tavelure, ce qui nécessite, à la première occasion après l'arrêt des précipitations, l'application en temps opportun de mesures de protection des plantes.

Source : NIMH