

Au début du mois de mai – conditions de formation de gel dans les hauts champs et les bassins

Автор(и): Растителна защита

Дата: 01.05.2023 Брой: 5/2023



Les précipitations généralisées de la seconde moitié d'avril ont maintenu de bons niveaux de réserve hydrique des sols pour les cultures agricoles dans la couche de 50 cm, entre 80 et 90 % de la capacité au champ (CC).

Au cours de la période de sept jours à venir, les conditions agrométéorologiques continueront d'être déterminées par un temps instable. Les processus de végétation des cultures agricoles se dérouleront à un rythme modéré sous des températures moyennes quotidiennes proches ou inférieures aux normes climatiques pour la fin avril et le début mai. Le blé d'hiver sera principalement au stade de l'élongation des tiges. Le colza

continuera sa floraison. Pour le maïs et le tournesol, on observera la levée et le début de la formation des feuilles. Pour les arbres fruitiers, la floraison, la feuillaison et la nouaison auront lieu. Pour la vigne, on observera le développement de 1 à 3 feuilles.

Le temps instable de la période, avec des averses fréquentes, gênera la réalisation des travaux de préparation du sol avant semis et des semis des cultures de printemps tardives, ainsi que la mise en œuvre des traitements phytosanitaires. Après la cessation des précipitations, des traitements préventifs sont recommandés contre le mildiou et l'excoriose de la vigne, la tavelure des arbres à pépins, la pourriture brune précoce (flétrissement des fleurs) et la criblure des arbres à noyau, et contre la cloque du pêcher.

Au début de la période, dans les champs et bassins plus élevés, des conditions propices à la formation de gelées au sol et à l'endommagement des cultures agricoles se produiront.

Source : NIMH