

Précipitations fréquentes et temps instable durant la seconde quinzaine de mai

Автор(и): Растителна защита
Дата: 20.05.2023 Брой: 5/2023



Au cours de la période à venir, les conditions agrométéorologiques seront à nouveau déterminées par un temps instable, avec des précipitations fréquentes, ce qui maintiendra de bonnes réserves d'humidité dans la couche de sol de 50 et 100 cm.

Dans la plupart des régions du pays, à l'exception de certains endroits dans les régions orientales (Tchirpan, D. Tchiflik, Karnobat), les réserves d'humidité du sol dans la couche d'un mètre pour les cultures semées en automne sont supérieures à 80 % de la capacité au champ (CC).

Pendant cette période, le développement des cultures agricoles se poursuivra à un rythme modéré, avec des températures quotidiennes moyennes proches des normes climatiques pour la seconde moitié du mois de mai. Vers le milieu de la troisième décade, dans les zones de plein champ, les cultures céréalières d'hiver seront en phase de formation et de remplissage du grain. À la fin de la période, dans certaines localités des régions méridionales (Sandanski, Karnobat), le début du stade de maturité laiteuse sera également observé chez l'orge.

Chez le tournesol et le maïs, la formation des feuilles sera en cours.

Chez la vigne, le stade de l'émergence des inflorescences prédominera. Cette phénophase est critique pour l'infection des vignes par le mildiou (*Plasmopara viticola*) et l'oïdium (*Uncinula necator*).

Les précipitations prévues pendant la période maintiendront des conditions favorables au développement des maladies fongiques : les rouilles, la septoriose et la fusariose de l'épi chez le blé ; les mildious chez les cultures maraîchères et la vigne ; la pourriture brune tardive chez les fruits des cultivars précoces de cerisier.

À la fin du mois de mai, les cultivars de cerisier mi-précoces sont endommagés par la mouche de la cerise. Pour réduire les dégâts causés par ce ravageur dangereux, il est recommandé qu'au début du stade de maturation, à la première occasion après la cessation des précipitations, un traitement soit effectué avec des insecticides ayant un délai avant récolte court.

Source : INMH