

Probabilité accrue de grêle et forte pression infectieuse des champignons pathogènes sur les cultures agricoles en juin

Автор(и): Растителна защита

Дата: 06.06.2023 Брой: 6/2023



Durant la première décade de juin, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par un temps instable et frais pour la saison. Les précipitations prévues au cours de la décade maintiendront un niveau élevé de réserves en eau du sol dans les couches de 50 cm et 100 cm – dans la plupart des zones de plein champ au-dessus de 80–85% de la capacité au champ (CC). La présence de très bonnes réserves hydriques du sol début juin aura un effet bénéfique sur les cultures céréalières d'hiver, chez lesquelles le remplissage du grain, la formation du grain et le stade de la maturité laiteuse se dérouleront dans les cultures des régions méridionales et sud-orientales du pays. Durant la période interphases remplissage du grain – maturité laiteuse, les dégâts sur

le blé sont causés par les larves de la punaise des blés, ce qui nécessite une inspection des cultures et, lorsque la densité du ravageur dépasse le seuil de nuisibilité économique (2 larves/m²), un traitement en temps opportun.

Après le temps frais du début de la seconde décade, une augmentation des températures et une accélération des rythmes de développement des cultures agricoles sont prévues. D'ici la mi-juin, dans la plupart des zones de plein champ, l'orge atteindra le stade de la maturité cireuse.

Durant la plupart des jours de la seconde moitié de juin, le développement des cultures agricoles se déroulera à des températures proches des normes climatiques. Au début de la troisième décade, le blé sera principalement au stade de maturation.

D'ici la fin du mois, une partie des cultures de printemps entrera dans des stades de développement reproductif : chez le tournesol, le début de la floraison sera observé, et chez les hybrides précoces de maïs – l'épiaison et la floraison de la panicule.

Les conditions météorologiques en juin maintiendront un fond infectieux élevé des agents pathogènes fongiques : les mildious sur les cultures légumières, la pourriture brune tardive sur les cultivars tardifs de cerisier, la tavelure et l'oïdium sur les arbres fruitiers. Chez la vigne, la période interphases de la floraison des inflorescences à la nouaison au stade pois est critique pour l'infection par le mildiou.

Au cours du mois, des conditions plus favorables pour la réalisation des traitements phytosanitaires interviendront dans la première moitié de la seconde et durant la plupart des jours de la troisième décade.

En juin, la probabilité de chutes de grêle restera élevée. Après un épisode grêleux, les cultures fruitières et légumières touchées doivent être traitées à la première opportunité (de préférence dans les 48 heures suivant l'événement) avec des fongicides à base de cuivre.