

Soin de protection des pattes pour la vigne en juin

Автор(и): Растителна защита
Дата: 02.06.2023 Брой: 6/2023



* Durant cette période, les vignes sont de la phénophase « *floraison complète* » à la phénophase « *taille du pois* » - « *fermeture de la grappe* »

Principaux ravageurs pour la période :

Mildiou de la vigne *Plasmopara viticola*, **Oïdium** *Oidium tuckeri*, **Pourriture grise** *Botrytis cinerea*, **Eudémis de la vigne** *Lobesia botrana*, **Pulvinaire de la vigne** *Pulvinaria vitis*, **Acarien jaune de la vigne** *Schizotetranychus viticola*



Mildiou de la vigne Plasmopara viticola

Mildiou de la vigne

Sur les jeunes feuilles, la maladie apparaît sous forme de taches arrondies, huileuses, vert pâle, visibles par transparence. Les taches s'étendent et brunissent, et sur leur face inférieure se forme un feutrage blanc de sporulation. En cas de forte attaque, les feuilles se déforment, se dessèchent et tombent prématurément. Les inflorescences, pédicelles et rafles des grappes attaquées se couvrent de feutrage blanc, se dessèchent et certaines tombent. Les baies en croissance s'infectent à partir des pédicelles, leur peau autour devenant brun pâle, les baies se flétrissent, brunissent et se momifient.

La météo variable, les averses fréquentes, ainsi que la croissance intensive des vignes en juin, nécessitent la poursuite des traitements contre le mildiou de la vigne. Lors de l'utilisation de fongicides de contact, les intervalles entre les pulvérisations sont de 3 à 7 jours, avec les fongicides localement systémiques de 7 à 10 jours, et avec les systémiques de 10 à 14 jours. En cas d'averses fréquentes et de présence d'infection, les intervalles sont raccourcis.

LEYMAI et LIETO - un contrôle réussi du MILIDIOU dans les vignobles, les pommes de terre et les tomates

Produits phytopharmaceutiques autorisés : Bordo Mix - 500-600 g/da, Vitra 50 WP, Cuprohyd 50 WP - 0.15% (150 g/da), Kocide 2000 WG - 0.12%, Coprantol Duo - 200 g/da, Cuproxat FL - 0.3%, Cuprocin 35 WP - 200-300 g/da, Pergado F 45 WG - 200 g/da, Funguran OH 50 WP - 0.15%, Champion WP - 0.15%.

Lorsque les conditions climatiques sont favorables au développement du mildiou – averses fréquentes et temps plus frais – il est nécessaire que le premier traitement soit effectué avec des fongicides à action systémique.

Zorvec™ Vinabel™ - une révolution dans le contrôle du mildiou dans les vignobles

Fongicides autorisés à action localement systémique et systémique : Alial 80 WG - 75-330 g/da, Folpan 80 WDG - 0.15%, Delan Gold - 70 ml/1000 m², Quadris 25 SC - 0.075%, Melody Compact 49 WG - 150-175 g/da, Mikal Flash - 0.3%, Orondis Ultra - 67 ml/da, Ridomil Gold R WG - 500 g/da, Ridomil Gold Combi 45 WG - 200 g/da, Folpan 80 WDG - 0.15%, Profiler 71.1 WG - 200-225 g/da, Solofol - 188 g/da, Zorvec Vinabel - 50 ml/da, Leymai - 37.5 ml/da, Vitene Tripolo R - 400-450 g/da,

Coprantol Duo – le nouveau fongicide de contact à double CUIVRE et EFFET renforcé



oïdium Oidium tuckeri

Oïdium

Une humidité atmosphérique élevée et le réchauffement soutenu du temps au cours du mois sont des prérequis pour le développement de la maladie. Sur la face supérieure des feuilles attaquées, se forment des taches jaunâtres-vertes avec un feutrage gris-blanc, sous lequel les tissus nécrosent. Les feuilles attaquées se déforment, se dessèchent, mais restent sur les ceps. Les rameaux infectés sont également déformés. Sur les baies attaquées apparaissent de petites taches, couvertes d'un feutrage gris-blanc. Lorsqu'on le frotte, les tissus de la baie en dessous sont visibles, présentant une structure brune en réseau. Les baies se fissurent profondément et les pépins sont exposés.

Les traitements doivent être effectués tous les 8 à 10 jours, en fonction des conditions climatiques, de la sensibilité variétale, du degré d'attaque et du mode d'action du fongicide utilisé.

Produits phytopharmaceutiques autorisés : Eminent 125 ME - 24 ml/da ; Carbicur - 500 g/da ; Collis SC - 30-40 ml/da ; Quadris 25 SC - 0.075% ; Kumulus - 200/300 g/da ; Kusabi - 30 ml/da ; Microthiol - 1210 ml/da, Talendo 20 EC - 20-25 ml/da ; Thiovit Jet 80 WG - 0.3% (avant floraison) et 0.2% (après floraison) ; Topaz 100 EC - 30 ml/100 l de bouillie ; Flint Max 75 WG - 0.016% ; Sulgran - 1250 g/da ; Taegro - 18.5-37.0 g/da ; Dinali 090 DC - 50-65 ml/da ; Domark 10 EC - 25-30 ml/da, Password 25 WG - 30-40 g/da, Reviona - 130 ml/1300 m² ; Riza 25 EW - 40 ml/da ; Sercadis - 15 ml/da ; Spirox - 60 ml/da ; Domark 120 EC - 25-30 ml/da.



pourriture grise Botrytis cinerea

Pourriture grise

Dans la phénophase « *floraison complète* », des taches brunes se forment sur les fleurs et les pédicelles, qui se couvrent de la sporulation du pathogène. Ces symptômes sont connus sous le nom de **pourriture grise précoce**.

Par temps pluvieux et chaud, immédiatement après la floraison, à l'apparition de la nouaison et à la fermeture de la grappe, une pulvérisation est effectuée avec l'un des produits phytopharmaceutiques enregistrés.

Produits phytopharmaceutiques autorisés : Avalon - 250 ml/da, Banjo - 100-150 ml/da, Botrybel - 0.4-1.5 l/da, Cantus - 100 g/da, Orius 200 EW - 50 ml/da, Folpan - 0.15%, Geox WG - 50 g/da, Mevalon - 160-400 ml/da, Prolectus 50 WG - 120 g/da, Switch 62.5 WG - 100 g/da, Follow 80 WG - 187.5 g/da.



eudémis de la vigne Lobesia botrana

Eudémis de la vigne

En juin, les papillons de la deuxième génération du ravageur volent. Ils pondent leurs œufs sur les baies de la taille d'un pois (nouaison). Les larves endommagent la nouaison en rongant et en vidant l'intérieur des baies avec les pépins. Les baies endommagées sont légèrement enveloppées de fils de soie. Une larve endommage de 7 à 24 baies.

Le traitement doit être effectué au **seuil d'intervention** : pour les cépages de table 6-7 larves pour 100 baies en nouaison, et pour les cépages de cuve 11-12 larves pour 100 baies en nouaison.

Coragen® 20 SC – stoppez les ravageurs au bon moment

Produits phytopharmaceutiques autorisés : Afikar - 40 ml/da, Beltirul - 50-100 g/da, Delmur - 50 ml/da, Lamdex Extra - 80 g/da, Coragen 20 SC - 15-21.6 ml/da, Meteor - 70-90 ml/da, Decis 100 EC - 12.5-17.5 ml/da.



Pulvinaire de la vigne

Au cours du mois, les larves éclosent en masse et se dispersent sur les feuilles, les rameaux et les rafles, d'où elles sucent la sève. Suite aux dégâts, les vignes s'affaiblissent.

La lutte chimique est dirigée contre les jeunes larves.

Produit phytopharmaceutique autorisé : Ovipfrom Top EC - mai-août – 1000-2000 ml/da, Linecoil - 1.5 l/da

Portez attention à la tavelure de la vigne

