

Juillet – un test pour les cultures agricoles

Автор(и): Растителна защита
Дата: 02.07.2023 Брой: 7/2023



Durant la première et la deuxième décades de juillet, les conditions agrométéorologiques continueront d'être déterminées par un temps instable, avec des précipitations fréquentes, ce qui entravera l'activité la plus importante de la saison – la récolte du blé et le traitement en temps opportun contre les maladies et les ravageurs dans les cultures agricoles. Les précipitations supérieures à la normale en juin dans la plupart des régions du pays, à l'exception des régions du sud-est, ont détérioré l'état phytosanitaire des cultures maraîchères et des arbres fruitiers, et dans certains endroits des régions occidentales, ont conduit à des rendements compromis pour les cerises.

Durant la première et la deuxième décades de juillet, une probabilité accrue de précipitations intenses, substantielles et de grêle est à nouveau prévue – un autre défi pour les cultures agricoles et un risque de

dispersion de la récolte de grains mûrs. Durant cette période, la végétation des cultures de printemps avec un bon approvisionnement en humidité se déroulera à un rythme modéré, sous des températures quotidiennes moyennes proches des normes climatiques. Pour le maïs, selon sa précocité, différentes phases seront observées : formation des feuilles, épiaison, floraison de la panicule et soie. Pour le tournesol dans les zones de plein champ, la floraison, la fécondation et le remplissage des grains auront lieu.

Durant la troisième décade, le développement des cultures agricoles se déroulera dans les conditions chaudes typiques de la fin juillet. Durant cette période, des températures maximales extrêmement élevées sont prévues, localement jusqu'à 38-39°C, ce qui affectera négativement la floraison et la fécondation des cultures maraîchères et des hybrides de maïs plus tardifs. Durant la décade, les hybrides de maïs précoces entreront en phase de maturité laiteuse. Pour le tournesol semé dans les délais agrotechniques, localement dans la plaine du Danube, le début du stade de maturation sera observé.

Le temps relativement sec et chaud prévu durant la troisième décade de juillet limitera le développement d'un certain nombre de maladies fongiques, à l'exception des oïdiums sur les arbres fruitiers, les cultures maraîchères et les vignes. Dans les cultures fruitières, la lutte contre la deuxième génération de carpocapses ne doit pas être sous-estimée. Les traitements contre les maladies et les ravageurs doivent être effectués durant les heures les plus fraîches de la journée, en utilisant des produits phytosanitaires avec un délai avant récolte approprié, en fonction de la période de maturation des cultures.

Source : NIMH