

Автор(и): Растителна защита
Дата: 02.07.2023 Брой: 7/2023



En juillet, dans les **vergers de pommiers** où aucune infection par la tavelure n'est survenue, les pulvérisations contre cette maladie sont arrêtées. En présence d'infection sur les feuilles et les fruits et avec des averses fréquentes, le risque d'infections tardives et d'une augmentation du degré de dommage aux fruits persiste, ce qui dans ce cas nécessite des traitements même pendant cette période.

Pour les cultivars de pommiers sensibles à l'oïdium, les pulvérisations contre cette maladie se poursuivent également. Pour lutter simultanément contre les deux maladies, l'un des fongicides suivants est utilisé : Bellis – 80 g/da, Sulgran – 750 g/da et Kumulus – 600–900 g/da contre l'oïdium, et Chorus 50 WG – 0,03 %, Difcor 250 EC – 15 ml/da, Koprations Duo – 300 g/da, Scab – 300 ml/da et Captan 80 WG – 150–180 g/da contre la tavelure. Pour un contrôle simultané des deux maladies, les produits suivants sont adaptés : Flint Max 75 WG – 0,02 %, Score 250 EC – 0,02 %, Luna Experience – 20–75 ml/da, Thiovit Jet 80 WG – 600 g/da, Revyona – 200 ml/da.

Pour prévenir l'apparition de résistance du champignon responsable de la tavelure (*Venturia inaequalis*), il est préférable d'alterner des produits ayant des modes d'action différents sur l'agent pathogène ou d'utiliser des mélanges de fongicides pour son contrôle.

Les cultivars résistants à la tavelure – Prima, COOP-10, Frolina, Liberty, Jonafree, Jonathan, Pioneer, McFree, Pilot, Topaz, Novamak, Sava, Rubinola, etc., ne sont pulvérisés que contre l'oïdium.

Pour le **poirier**, les pulvérisations contre la tavelure et les taches foliaires blanches et brunes doivent être poursuivies. Pour lutter contre ces maladies, l'un des fongicides suivants est utilisé : Difcor 250 EC – 15 ml/da, Luna Experience – 20–75 ml/da, Captan 80 WG – 150–180 g/da, Thiovit Jet 80 WG – 600 g/da.

Pour le **prunier** en juillet, les pulvérisations sont dirigées contre la moniliose et la rouille. Contre la moniliose, la pulvérisation est effectuée avec l'un des fongicides suivants : Difcor 250 EC – 20 ml/da, Captan 80 WG – 150–180 g/da, Chorus 50 WG – 0,045 %, Geoxe – 40–60 g/da. Contre la rouille, Signum WG – 45 g/da est homologué, ce qui est également efficace contre la moniliose.

Début juillet, les fruits des cultivars précoces de pêcher commencent à mûrir et pendant cette période, ils ne sont pas pulvérisés. Pour les **cultivars tardifs de pêcher**, la lutte contre l'oïdium, le criblure et la moniliose se poursuit. Contre l'oïdium, l'un des fongicides suivants est utilisé : Score 250 EC – 0,02 %, Luna Experience – 50 ml/da, Topaz 100 EC – 0,03 %, Thiovit Jet 80 WG – 600 g/da. Pour lutter contre la moniliose, la pulvérisation est effectuée avec Delan 700 WDG – 0,05 %, Chorus 50 WG – 0,045 % ou Luna Experience – 63–75 ml/da.



En juillet, les abricots mûrissent et ils ne sont pas pulvérisés.

Pour la **framboisier**, pendant cette période, aucune pulvérisation n'est effectuée, à l'exception des **cultivars remontants** comme Lyulin. Pour ceux-ci, des traitements contre la didymellose et l'antracnose sont nécessaires. L'un des fongicides suivants est utilisé : Signum WG – 100 g/da et Funguran OH 50 WP – 0,15 %. Avec des averses fréquentes et une humidité de l'air élevée, une pulvérisation contre la pourriture grise est également nécessaire. Switch 62.5 – 100 g/da est utilisé.

Après la récolte, les feuilles des **plantations de fraisiers** sont tondues, retirées de la plantation et détruites par brûlage ou enfouies pour qu'elles se décomposent.