

La seconde quinzaine de juillet – temps sec et chaud

Автор(и): Растителна защита
Дата: 15.07.2023 *Брой:* 7/2023



Dans la seconde moitié du mois de juillet, le développement des cultures agricoles se poursuivra à un rythme accéléré sous l'effet de températures supérieures à la normale pour la deuxième décade de juillet.

Pour le maïs, selon la précocité des hybrides, différentes phases seront observées – formation des feuilles, épiaison, floraison de la panicule et apparition des soies. Pour le tournesol, la floraison et le remplissage des graines auront lieu. La consommation en eau active des cultures et l'absence de précipitations d'importance agricole durant cette période entraîneront une diminution des réserves en eau du sol. Dans certaines zones de l'est de la Bulgarie, un épuisement des réserves d'humidité du sol dans la couche de 50 cm sera observé, ce qui nécessitera la mise en place d'un régime d'irrigation approprié.

Les conditions pour réaliser les traitements phytosanitaires seront présentes durant les heures plus fraîches de la journée, en soirée et tôt le matin. Pendant cette période, les traitements contre l'oïdium, la tavelure et le carpocapse dans les vergers, et contre l'oïdium et l'eudémis dans les vignobles doivent se poursuivre.

Les prévisions de temps chaud et sec exigent que la récolte des céréales soit effectuée avec une prudence accrue et dans le respect des mesures agrotechniques afin de prévenir le risque d'incendie dans les zones agricoles.

Source : NIMH