

# Fin juillet et début août – le développement des cultures agricoles se poursuivra à des températures proches des normes climatiques et sous un déficit d'humidité du sol.

*Автор(и): Растителна защита  
Дата: 28.07.2023 Брой: 7/2023*



La chaleur durant la plupart des jours de la troisième décennie de juillet, avec des températures maximales extrêmement élevées allant jusqu'à 40-42°C et au-delà, a perturbé le déroulement normal des processus de végétation des cultures agricoles. Ces valeurs ont provoqué un stress thermique et des brûlures foliaires sur une partie des cultures de printemps tardives, ainsi qu'une chute prématurée des feuilles des arbres fruitiers. (À la station agrométéorologique de Silistra, un jaunissement prématuré des feuilles est observé sur 50% des peuplements de maïs cultivés en conditions non irriguées).

Après le bref mais significatif refroidissement de la fin de la période de sept jours écoulée, le développement des cultures agricoles se poursuivra, durant les derniers jours de juillet et le début août, à des températures proches des normes climatiques et dans des conditions de déficit hydrique du sol. Les précipitations de fin juillet étaient de caractère local et, dans la plupart des régions du pays, à l'exception de certains endroits du nord-ouest (N. Selo, Lom, Knezha, Pleven) et du sud-est (Sliven, Karnobat, Burgas), elles étaient insignifiantes, inférieures à 10 l/m<sup>2</sup>. Pour la période suivante, aucune précipitation d'importance agronomique n'est prévue, et l'application d'un régime d'irrigation approprié reste une mesure prioritaire pour les cultures agricoles tardives. Début août, les hybrides de maïs précoces entreront en phase pâteuse, les hybrides mi-précoces seront en phase laiteuse, et les hybrides de maïs plus tardifs connaîtront la formation et le remplissage des grains. Pour le tournesol, dans certaines parties de la plaine du Danube et dans les régions du sud, la phase de maturation se déroulera.

Fin juillet et début août, les traitements phytosanitaires doivent être effectués durant les heures les plus fraîches, en utilisant des produits ayant un délai avant récolte approprié, en accord avec la période de maturation des cultures. Dans les vergers, la lutte contre la deuxième génération de carpocapses ne doit pas être sous-estimée. Il est recommandé de traiter les cultures maraîchères affectées par les chutes de grêle survenues à la fin de la période écoulée avec des fongicides à base de cuivre.

*Source : NIMH*