

Septembre – conditions favorables à la formation d'un rendement supplémentaire des cultures légumières tardives

Автор(и): Растителна защита

Дата: 04.09.2023 Брой: 9/2023



Durant la plupart des jours de la première décade de septembre, des conditions thermiques supérieures à la normale sont prévues, ce qui accélérera les stades finaux de développement des cultures agricoles tardives. Durant cette période, les hybrides de maïs mi-tardifs seront aux stades de maturité cireuse et pleine, tandis que les hybrides tardifs seront au stade de maturité laiteuse et en transition vers la maturité cireuse.

Au début de la deuxième décade, les conditions agrométéorologiques subiront un changement. Jusqu'au milieu de la troisième décade, elles seront déterminées par un temps instable et des températures proches des

normes climatiques. Durant cette période, des précipitations d'importance économique sont prévues, qui, après la sécheresse accentuée, amélioreront les conditions pour réaliser le travail du sol pré-semis des parcelles destinées aux cultures d'automne. D'ici la fin de la deuxième décennie de septembre se situe la période agrotechnique optimale pour le semis du colza d'hiver.

Durant la deuxième décennie, les hybrides de maïs tardifs achèveront également leur développement, et le riz sera aux stades de maturité cireuse et pleine. Les précipitations fréquentes prévues durant la deuxième et la première moitié de la troisième décennie augmenteront le risque de développement d'agents pathogènes causant la pourriture des productions fruitières et légumières en maturation – la pourriture grise sur les raisins (*Botrytis cinerea*), la moniliose (*Monilinia fructigena*) sur les fruits des variétés fruitières d'automne-hiver, le mildiou de la pomme de terre (*Phytophthora infestans*) sur les tomates de production tardive, etc.

Dans la seconde moitié de la troisième décennie, un temps sec et des conditions favorables à la récolte des raisins sont attendus. En raison des températures estivales supérieures à la normale, certaines des variétés de raisins de cuve plus tardives atteindront la maturité technologique plus tôt que les dates habituelles.

À la fin du mois de septembre, il est conseillé d'inspecter les vergers de poiriers pour détecter la présence d'un ravageur dangereux – le charançon du bourgeon du poirier. La lutte contre ce ravageur n'est efficace que contre les individus adultes au début de l'automne. Si la densité du ravageur dépasse le seuil de nuisibilité économique (3 charançons par arbre), un traitement est nécessaire.

En septembre, des températures minimales critiques ne sont pas prévues, et les conditions permettront la formation d'une production supplémentaire à partir des cultures légumières tardives sensibles au gel.

Source : NIMH