

En novembre, les conditions seront favorables pour effectuer le travail du sol saisonnier et les semis d'automne retardés.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 05.11.2023 Брой: 11/2023



En novembre, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par des températures et des précipitations autour et au-dessus des normes climatiques.

Les précipitations rares et les températures anormalement élevées d'octobre ont conduit à un approfondissement de la sécheresse existante. En plein automne, les réserves en humidité du sol dans la couche de 50 cm sont complètement épuisées, et dans une partie des régions arables, l'humidité productive est absente sur toute l'épaisseur du mètre de sol. Dans de nombreuses régions du pays, en raison des conditions

défavorables, le travail du sol de présemis des parcelles destinées aux cultures d'automne a été reporté, et les délais agrotechniques pour les semis des céréales d'hiver n'ont pas été respectés.

En cas de semis retardé, il est généralement recommandé d'augmenter la densité de semis de 5 à 10 % afin, en l'absence de tallage productif, de maintenir le nombre d'épis par mètre carré pour préserver les rendements », partage le chef-assistant Alexiev de l'IRGR « K. Malkov » à Sadovo pour Nivabg.com.

Au cours de la première décade de novembre, un changement progressif et positif des conditions agrométéorologiques est attendu. Au début du mois, des précipitations sont prévues, ainsi qu'une amélioration de l'état hydrophysique de la couche supérieure du sol et des conditions pour réaliser le travail du sol saisonnier et les semis d'automne retardés.

Des précipitations d'importance économique et une augmentation des réserves en humidité du sol dans la couche de 50 cm sont attendues dans la seconde moitié de novembre. Durant cette période, les phases initiales de végétation des cultures d'automne semées se dérouleront avec des températures moyennes journalières supérieures à la normale. Fin novembre, différentes phases seront observées pour le blé et l'orge – de la levée à la 1ère, 2ème et 3ème feuille.

Au cours du mois, aucune température minimale critique n'est prévue pour les céréales d'hiver en phase de levée.

En novembre, des conditions plus favorables pour la plantation des arbres fruitiers et pour la réalisation des pulvérisations de protection des plantes d'automne dans les cultures fruitières, visant à limiter les infections de tavelure, de moniliose précoce, de criblure, de cloque du pêcher et d'autres pathogènes hivernants, se présenteront durant la seconde décade et à la fin du mois.

Source : NIMH