


Excellente solution pour le désherbage du blé, de l'orge, de l'avoine et du seigle

Автор(и): ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ

Дата: 30.11.2023 Брой: 11/2023



Les céréaliculteurs recherchent des herbicides capables de contrôler un large spectre de mauvaises herbes dicotylédones en un seul traitement. Cela les aide à optimiser leurs ressources pendant les périodes de forte intensité de main-d'œuvre.

Tripali® WG de FMC est un herbicide qui peut être utilisé dans diverses cultures céréalières pour lutter contre les gails difficiles à gérer et autres adventices.

Le **gaillet** est l'une des mauvaises herbes les plus problématiques en Europe. Il entre en compétition avec les cultures céréalières pour l'eau, la lumière, les nutriments et l'espace de croissance. Une seule plante par mètre

carré peut entraîner une perte de rendement de 5 %. De plus, le gaillet peut être particulièrement problématique à la récolte. Lorsqu'il est traité avec **Tripali® WG**, le gaillet ne sera plus un problème.

Tripali® WG est un mélange granulaire homogène, formulé sous forme de granulés dispersables dans l'eau (WG). Il est composé de trois substances actives : le metsulfuron-méthyle, le tribénuron-méthyle et le florasulam. Volume de bouillie recommandé – 10 – 40 l/da. Selon l'infestation et les espèces de mauvaises herbes, le volume de bouillie utilisé doit assurer une couverture complète et uniforme de la masse foliaire. La dose d'application est de 3,5 – 5 g/da.

Tripali® WG est un herbicide systémique sélectif, principalement absorbé par les feuilles et transloqué vers les points de croissance des adventices peu après l'application. Son mode d'action repose sur l'inhibition de l'enzyme acétolactate synthase (ALS). La synthèse continue des protéines est nécessaire pour la croissance et la division cellulaires des plantes. La valine, la leucine et l'isoleucine sont essentielles à la division et à la croissance des cellules végétales. Chez les adventices sensibles, la division cellulaire s'arrête quelques heures après l'application du produit, ce qui provoque un arrêt immédiat de la croissance. Les symptômes visibles (décoloration des adventices, blanchiment, nécrose) s'observent dans les 1 à 2 semaines suivant le traitement, ce qui dépend également des conditions de croissance et de la sensibilité des adventices. Les adventices moins sensibles et plus développées peuvent ne pas être complètement détruites, mais restent inhibées dans leur développement et ne concurrencent pas la culture pour l'eau et les nutriments.

Pour obtenir un effet maximum, **Tripali® WG** doit être appliqué aux premiers stades de croissance des adventices en croissance active, après la troisième feuille de la culture. En cas de forte densité d'adventices ou de présence d'adventices avec une épaisse couche cireuse ou des poils, pour une meilleure efficacité, il est recommandé d'ajouter l'adjuvant Trend 90 à Tripali.

Tripali® WG a une large fenêtre d'application, ce qui offre à l'agriculteur une plus grande flexibilité. Un traitement précoce aide à prévenir la compétition du gaillet et d'autres adventices problématiques pour l'eau et les nutriments nécessaires à la culture.

Tripali® WG est un herbicide à large spectre, éprouvé et hautement efficace, développé pour fournir une solution universelle de contrôle des mauvaises herbes dicotylédones dans les cultures céréalières.