

Décembre – des températures saisonnières supérieures à la moyenne au rétablissement de la dormance relative dans les cultures d'automne

Автор(и): Растителна защита

Дата: 04.12.2023 Брой: 12/2023



Après la chute brutale des températures fin novembre, qui a entraîné un ralentissement et un arrêt de la végétation des cultures d'automne dans la plupart des zones de plein champ, début décembre, les conditions agrométéorologiques vont subir un changement substantiel.

Durant les premiers jours du mois, une hausse des températures est prévue et les valeurs moyennes journalières dans les régions du sud et le long de la côte de la mer Noire dépasseront le minimum biologique requis pour la végétation des cultures céréalières d'hiver.

Début décembre, les conditions agrométéorologiques en Bulgarie orientale différeront significativement de celles du reste du pays. Dans les régions orientales, des températures plus élevées que la normale pour la saison sont prévues, avec des valeurs maximales autour de 17°C-18°C et des valeurs moyennes journalières nettement supérieures au minimum biologique requis pour la végétation des cultures céréalières d'hiver.

Une baisse des températures et le rétablissement de la dormance relative dans les cultures d'automne sont attendus durant la seconde moitié de la première décade.

Pendant la plupart des jours des deuxième et troisième décades, les conditions agrométéorologiques seront dynamiques, avec l'alternance de courtes périodes de températures moyennes journalières autour et au-dessus des normes climatiques, mais dans des fourchettes qui maintiendront les cultures céréalières d'hiver en dormance dans la plupart des zones de plein champ du pays. Des exceptions sont à nouveau attendues dans les régions les plus méridionales, où durant les périodes relativement plus chaudes, des conditions seront créées pour une végétation retardée et de courte durée dans les cultures semées à l'automne, mais cela ne conduira pas à un changement substantiel de l'état phénologique des peuplements.



Cette année, la sécheresse automnale prolongée a retardé les semis de blé et une grande partie des peuplements ont été semés en novembre, après les délais agrotechniques. Pour cette raison, les peuplements de novembre entreront dans l'hiver au stade levée et 1-2 feuilles. Dans les cultures céréalières d'hiver semées en octobre, les peuplements au stade trois feuilles prévaudront au début de l'hiver.

En décembre, les valeurs prévues des températures minimales, jusqu'à moins 9-10°C, dans des conditions sans couverture neigeuse et avec une durée plus prolongée, présenteront un risque pour les peuplements de novembre levés, tardivement semés et non encore endurcis.

Les précipitations prévues au cours du mois seront proches des normes climatiques et augmenteront les niveaux de réserves en eau du sol, même dans les couches plus profondes. Après les précipitations généralisées de pluie et de neige durant la troisième décade de novembre, qui dans de nombreuses parties du pays ont dépassé 50-60 //m², et dans une partie de la plaine du Danube 80-90 //m², une augmentation des réserves en eau du sol dans la couche de 100 cm s'est produite et le déficit hydrique dans les cultures d'automne a été surmonté.

Les précipitations attendues durant la période maintiendront une teneur en eau élevée dans les couches supérieures du sol et des conditions défavorables pour la réalisation des travaux saisonniers de travail du sol et des activités phytosanitaires dans les vergers.

Source : NIMH