

Janvier commence avec des températures anormalement élevées

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.01.2024 Брой: 1/2024



Les anomalies climatiques du début de l'hiver, avec des températures anormalement élevées dépassant 20–21°C en de nombreux endroits, ont conduit à une reprise des processus de végétation dans les cultures semées en automne dans certaines parties des régions arables du pays. Le temps anormalement doux a provoqué, dans certaines des régions extrêmes du sud-ouest, un gonflement prématuré et indésirable des bourgeons chez certaines espèces d'arbustes et d'arbres fruitiers à floraison précoce telles que le cornouiller mâle, l'abricotier, le pêcher et le cerisier.

Au début du mois de janvier, les conditions agrométéorologiques continueront d'être déterminées par des températures supérieures à la normale et des valeurs quotidiennes moyennes dans les régions arables au-

dessus du minimum biologique requis pour l'apparition d'une végétation retardée dans les cultures céréalières d'hiver.

Au cours de la seconde moitié de la première décade, une baisse des températures et un changement des conditions agrométéorologiques sont prévus. Le refroidissement attendu durant cette période mettra fin à la végétation tardive des cultures céréalières d'hiver et entravera le développement intempestif de certaines espèces d'arbres, ce qui autrement conduirait à une réduction de leur rusticité hivernale. Durant les deuxième et troisième décades, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par des températures proches des normes climatiques, ce qui maintiendra les céréales d'hiver dans un état de dormance.

En janvier, les peuplements de blé et d'orge hiverneront dans différents stades phénologiques. Les céréales d'hiver semées tardivement à la fin de l'automne, dans les stations agrométéorologiques de Băzovec, Nikolaevo, Kazanlăk, Sliven et Chirpan, sont dans la phase de levée et le stade initial de formation des feuilles. Dans les peuplements semés en novembre à Kneža, Tărgoviște, Pazardžik, Haskovo et Ljubimec, le stade de la troisième feuille prédomine. Une petite partie des peuplements de blé et d'orge en certains endroits de la plaine du Danube – la station agrométéorologique de Novachene – et dans la basse plaine de Thrace supérieure dans la région de Plovdiv sont dans la phase de tallage, qui est la phase appropriée pour l'hivernage. En janvier, les températures minimales prévues, jusqu'à moins 13°C, ne présenteront pas de risque pour les cultures permanentes et pour les céréales d'hiver ayant atteint la phase de tallage. Dans des conditions sans couverture neigeuse, des valeurs comprises entre moins 10 et 13°C, si elles persistent pendant une période prolongée, seront critiques pour les peuplements semés tardivement et mal installés. Les précipitations prévues en janvier, autour et au-dessus de la norme, augmenteront les réserves en humidité du sol dans les couches de sol d'un mètre et de deux mètres. Fin décembre, les réserves en humidité du sol pour le blé dans la couche d'un mètre dans la plupart des régions arables étaient supérieures à 85–90% de la capacité au champ (CC).

Au cours du mois, des conditions plus propices à la réalisation de la taille hivernale des espèces fruitières à pépins se présenteront au début de la première et pendant la plupart des jours de la troisième décade.

Source : NIMH

