

Fin février – conditions propices au travail du sol des parcelles destinées aux semis de cultures de printemps, à la taille et aux traitements phytosanitaires dans les cultures permanentes.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 26.02.2024 Брой: 2/2024



Fin février, les conditions agrométéorologiques continueront d'être déterminées par des températures journalières moyennes supérieures au minimum biologique requis pour la reprise et la progression des processus végétatifs des céréales d'hiver. À la fin de la période automne-hiver d'accumulation d'humidité, les réserves en eau du sol dans la couche arable d'un mètre sont comprises entre 70% et 90% de la capacité au champ (CC).

Durant cette période, dans les peuplements de blé et d'orge semés tardivement et à développement retardé, le stade de croissance de la troisième feuille sera observé. Le stade de tallage sera observé dans les peuplements de la plaine du Danube et dans des endroits isolés des régions méridionales du pays – stations agrométéorologiques de Băzovec, Knezha, Novachene, Nikolaevo, Dolni Chiflik, Targovishte, Silistra, Lyubimets, Plovdiv, Pazardzhik, Kyustendil et Sandanski. Chez les espèces à noyau, le gonflement des bourgeons interviendra.

Carabe du blé – *Zabrus tenebrioides*

Pendant la plupart des jours de la période, à l'exception de certains endroits des régions occidentales où des précipitations sont prévues, les conditions seront favorables pour : le travail du sol dans les champs destinés aux semis de cultures de printemps ; la taille et les pulvérisations de protection des plantes dans les cultures permanentes ; l'inspection des peuplements de blé et d'orge pour détecter la présence et l'activité nuisible du campagnol commun et des larves du carabe du blé. Compte tenu de la reprise de la végétation des céréales d'hiver, la priorité devrait être donnée à l'achèvement de la fertilisation azotée des peuplements.

Source : NIMH