

# Au cours de la troisième décade de mars – risque de gel

*Автор(и):* Растителна защита  
*Дата:* 25.03.2024 *Брой:* 3/2024



À la fin de la deuxième et au début de la troisième décade de mars, dans de nombreux endroits des zones de plaine du pays, des conditions propices à la formation de gelées se sont créées, causant des dégâts de degrés variables aux floraisons des arbres fruitiers.

Au cours de la prochaine période de sept jours, les conditions agrométéorologiques seront à nouveau déterminées par un temps dynamique. Des températures moyennes quotidiennes supérieures au minimum biologique requis pour le déroulement des processus de végétation des cultures semées en automne sont prévues. Chez le blé et l'orge, la phase de tallage se poursuivra. Ce n'est que dans des endroits isolés des régions méridionales du pays que la phase de montaison sera observée.

Selon les données de l'Institut Agricole de la Dobroudja (IAD) - General Toshevo, d'octobre 2023 à fin février, la quantité totale de précipitations est de 205 litres par m<sup>2</sup>. Cependant, au cours des deux premiers mois de 2024, un total de 22 litres par m<sup>2</sup> est tombé. Dans le même temps, des températures élevées supérieures à 16°C et localement jusqu'à 19,6°C ont été enregistrées. Dans ces conditions, le blé n'entre généralement pas en dormance.

Ces dernières années, au cours du mois d'avril, nous assistons à des phénomènes désormais courants – des vagues de froid brutales avec des températures basses et des gelées. Le froid printanier combiné à la sécheresse peut avoir un impact sérieux sur le blé.

Dans certains champs, la présence de septoriose est observée, mais il est encore trop tôt pour un traitement fongicide, a rapporté le Prof. Ivan Kiryakov, PhD de l'IAD à Agri.bg. Fin mars, une commission formée par la Direction Régionale de l'Agriculture inspectera les champs de blé de la région de Dobrich afin de déterminer l'état des cultures, leurs stades de développement et d'éventuels problèmes à traiter dans les zones céréalières.

Dans les cultures permanentes, diverses phases phénologiques se produiront – du gonflement des bourgeons et du débourrement au stade bouton floral, à la floraison et à la feuillaison. Durant les premiers jours de la période, des gelées et des températures minimales négatives sont prévues, ce qui représentera un risque pour les cultures fruitières avancées dans leur développement.

Les précipitations attendues dans la seconde moitié de la période limiteront les possibilités de travaux des champs. Des conditions plus favorables pour la réalisation des activités agrotechniques saisonnières – le travail du sol pré-semis et le semis du tournesol, ainsi que les pulvérisations de protection des plantes dans les cultures agricoles, seront disponibles au début de la période. Les traitements doivent être effectués par temps calme et à une vitesse de vent allant jusqu'à 2-3 m/s. Durant la période, la fenêtre agrotechnique optimale pour le semis du tournesol dans le nord de la Bulgarie commence.

*Source : NIMH et Agri.bg*