

Fin avril et début mai – temps instable avec un risque de formation de gel et de dégâts aux cultures agricoles

Автор(и): Растителна защита

Дата: 29.04.2024 Брой: 4/2024



Au cours des sept prochains jours, les processus de végétation des cultures agricoles se dérouleront à des rythmes modérés, avec des températures quotidiennes moyennes proches des normes climatiques. Les pluies économiquement significatives survenues pendant la troisième décennie d'avril dans les régions agricoles du pays ont amélioré les conditions pour les phases initiales de développement du maïs et du tournesol, ainsi que pour la végétation des céréales d'hiver.

À certains endroits à Plovdiv, Stara Zagora et Sliven, des orages de grêle se sont produits, détruisant une grande partie de la récolte. Toutes les plantations de roses du village de Banya, à Sliven, ont été détruites par la grêle, et les vignobles ont également été touchés.

Pendant cette période, pour le blé et l'orge, les phases suivantes se produiront : l'allongement de la tige dans certaines cultures de la moitié ouest du pays et de la partie centrale de la plaine du Danube ; la transition vers l'épiaison et l'épiaison dans certaines régions de l'est et du sud de la Bulgarie – stations agronomiques de Targovishte, Silistra, Karnobat, Kazanlak, Plovdiv et Pazardzhik. Pour le maïs et le tournesol, l'émergence et le début de la formation des feuilles auront lieu, en fonction des dates de semis.

Pour la vigne, la formation des feuilles (1-3 feuilles) et la séparation des inflorescences seront observées.

Pour les céréales d'hiver, pendant les phases d'allongement de la tige et d'épiaison, les plantes subissent des dommages causés par l'altise des céréales et la punaise des céréales. Les cultures devraient également être inspectées pour le développement de l'oïdium.

Pour les espèces fruitières, après la floraison, les traitements se poursuivent contre la moniliose précoce chez les fruits à noyau, la tavelure et l'oïdium chez les fruits à pépins. Pour la vigne, les pulvérisations phytosanitaires visent à protéger la culture contre le mildiou et l'oïdium, ainsi que contre l'activité nuisible de l'acarien jaune de la vigne.

Les prévisions météorologiques instables avec des précipitations limiteront temporairement les possibilités de mener des activités agrotechniques. Au début de la période, dans les hautes plaines de l'ouest de la Bulgarie, il subsiste une probabilité de formation de gel et de dommages aux cultures agricoles.

Source NIMH