

Mai – météo instable et conditions favorables à une augmentation du niveau des infections fongiques

Автор(и): Растителна защита

Дата: 06.05.2024 Брой: 5/2024



Pendant la plupart des jours de la première décade de mai, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par un temps instable avec des précipitations fréquentes, ce qui créera des conditions favorables à l'augmentation du fond infectieux des maladies fongiques. Les processus végétatifs des cultures agricoles se dérouleront à des rythmes modérés à des températures proches des normales climatiques.

Les précipitations de la seconde moitié d'avril dans la plupart des zones de culture, entre 30 et 50 l/m², ont contribué à surmonter le déficit hydrique du sol pour les cultures d'automne, à l'exception de quelques endroits

du nord-ouest de la Bulgarie. Les précipitations prévues jusqu'à la mi-mai maintiendront des réserves d'humidité relativement bonnes dans la couche de sol de 50 cm, supérieures à 75 % de la CC (Capacité au Champ).

Pendant la première décade, les cultures de blé passeront par la phase d'épiaison – début et masse. Le colza sera en fleur.

Des conditions plus favorables pour la réalisation des activités agrotechniques saisonnières et des pulvérisations phytosanitaires pendant la première décade se présenteront au milieu de la période, lorsqu'un temps relativement sec est prévu.



Le criocère des céréales menace sérieusement les rendements de blé

Pendant cette période, les cultures de céréales d'hiver doivent être inspectées pour la présence et la densité de la punaise des céréales nuisible et du criocère des céréales.



Sur les vignes, les dégâts aux grappes florales sont causés par les chenilles de la première génération de la tordeuse de la vigne. Dès que le seuil de nuisibilité économique (SNE) est atteint, soit 6-8 chenilles pour 100 grappes pour les variétés de vin et 4-6 chenilles pour 100 grappes pour les variétés de table, un traitement rapide est obligatoire.

Après le temps instable jusqu'à la mi-mois, un changement des conditions agrométéorologiques est attendu dans la seconde moitié de mai. Une augmentation des températures moyennes journalières et une accélération des processus végétatifs des cultures d'automne et des cultures de printemps semées sont prévues. Pendant cette période, la formation des feuilles aura lieu chez le tournesol et le maïs.

Les précipitations attendues fin mai assureront les besoins accrus en humidité des céréales d'hiver dans le sol. Pendant cette période, le blé sera au stade de maturité laiteuse. Pour les cultures de tournesol semées dans les délais agrotechniques, la formation des inflorescences sera observée. En mai, la possibilité de grêle et le risque de dommages aux cultures agricoles subsistent. Pour les cultures pérennes et les cultures maraîchères touchées par la grêle, un traitement avec des fongicides à base de cuivre est recommandé pour limiter le risque d'infections secondaires par des agents pathogènes.

Des conditions plus favorables pour la réalisation des pulvérisations phytosanitaires contre un certain nombre de maladies – pourriture brune précoce, criblure, tavelure sur les espèces de fruits à pépins, mildious sur les cultures maraîchères et les vignes, fusariose de l'épi sur le blé – seront disponibles à la fin de la première décade, au début et à la fin de la deuxième, et pendant la plupart des jours de la troisième décade de mai.

Source NIMH