

Activités agrotechniques dans le verger en mai

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 06.05.2024 *Брой:* 5/2024



Pendant la majeure partie de la première décade de mai, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par un temps instable avec des précipitations fréquentes, ce qui créera des conditions favorables à l'augmentation du fond infectieux des maladies fongiques. Les processus végétatifs des cultures agricoles se dérouleront à des rythmes modérés à des températures proches des normes climatiques.

Après le temps instable jusqu'à la mi-mai, un changement des conditions agrométéorologiques est attendu dans la seconde quinzaine de mai. Une augmentation des températures moyennes quotidiennes est prévue. Des précipitations sont attendues fin mai. Tout au long du mois, la possibilité de grêle et le risque de dommages aux cultures agricoles demeurent.

Dans les pépinières fruitières

Dans les pépinières, le bon développement des bourgeons greffés est surveillé. Si nécessaire, un nouveau dessouchage des pousses issues du porte-greffe est effectué.

S'il y a un risque de strangulation, les liens des porte-greffes regreffés au printemps sont desserrés.

Les semis, les plantes mères et les pépinières sont cultivés. Si nécessaire, les plantes dans les semis sont éclaircies.

Dans les plantations fruitières

À la fin de la floraison, les ruches sont déplacées vers un autre emplacement – à au moins 5 km.



Dans les vergers de pêchers nouvellement plantés avec une couronne en gobelet ou en gobelet amélioré, une taille de formation est effectuée. Le soin est apporté à un bon enracinement et au développement des arbres dans les vergers nouvellement plantés – binage, dessouchage, arrosage si nécessaire. Les arbres des jeunes plantations denses sont attachés à une structure filaire. Les branches vigoureuses de deux et trois ans sont pliées et attachées aux fils pour réduire leur vigueur de croissance. Dans les jeunes plantations de 2 et 3 ans, une partie des fruits sur le gourmand – branche centrale est retirée. Le travail d'éclaircissage des pêches se

poursuit. Après l'achèvement final de la chute des fruits, les plantations sont irriguées. La matière organique des cultures d'engrais verts est labourée.

Le sol est maintenu exempt de mauvaises herbes et ameubli par un travail du sol peu profond régulier avec un cultivateur ou une herse. À la fin du mois, les arbres fruitiers sont fertilisés avec 15-20 kg/dka de nitrate d'ammonium ou la même quantité d'un autre engrais azoté.

La récolte des variétés précoces de cerises se poursuit.

Dans les plantations de fraises



La plantation printanière-estivale de plants de fraises, conservés au réfrigérateur, se poursuit. Après la plantation, une irrigation par aspersion est appliquée. Les zones plantées en avril sont désherbées. Dans les régions plus élevées, la paille est placée sous les hampes florales d'ici la fin du mois.

La récolte se poursuit. Lorsque les fruits sont transportés sur de plus longues distances, ils peuvent être récoltés un peu plus tôt. En cas de sécheresse pendant la maturation des fruits, il est nécessaire d'appliquer une irrigation par aspersion ou une irrigation par gravité.

Dans les plantations de framboises

Un travail du sol régulier est effectué. Les pousses de certaines variétés sont attachées à la structure de support, tandis que pour d'autres variétés, on veille à éviter qu'elles ne pendent dans les interlignes.



Pendant la floraison, il est conseillé de prévoir deux colonies d'abeilles par 10 dka.

Dans les plantations de cassis



Les soins se poursuivent – travail du sol et irrigation pour les zones d'enracinement. Les drageons faibles et superflus sont supprimés. En cas de sécheresse, un arrosage abondant est effectué. Le travail d'organisation de la récolte des fruits de cassis commence.

Dans les plantations d'autres cultures

Les porte-greffes de citron sont greffés en écusson. Le greffage du kaki se poursuit. La surface du sol est maintenue exempte de mauvaises herbes et régulièrement ameublie par un travail du sol peu profond. Un arrosage fréquent et régulier est assuré jusqu'à la deuxième décade.



La plantation d'*Actinidia chinensis* en pleine terre se poursuit. Après la plantation, elle est arrosée. Les vignes d'*Actinidia* sont régulièrement attachées à des branches de support auxiliaires. La tige ne doit pas s'enrouler autour de la branche de support, et les pousses latérales sur celle-ci sont retirées. Trois colonies d'abeilles sont fournies par 10 dka d'*Actinidia*.