

# Début juin – avec une combinaison favorable de chaleur et d'humidité, la végétation des cultures de printemps se développera.

*Автор(и): Растителна защита*

*Дата: 04.06.2024 Брой: 6/2024*



Au cours de la première semaine de juin, le développement des cultures agricoles se déroulera à un rythme accéléré dans des conditions thermiques supérieures à la normale et avec de très bonnes réserves d'humidité du sol - en raison des précipitations importantes de mai, qui ont dépassé les normes mensuelles dans la majeure partie du pays, à l'exception de certaines zones des régions de l'extrême nord-est et du sud-ouest.

Pendant cette période, le remplissage des grains se produira dans les céréales d'hiver des champs élevés. Dans les régions de plaine, le blé passera par les phases suivantes : laiteuse, transition vers la maturité cireuse

et maturité cireuse pour les cultures des régions du sud-est. Pour l'orge des régions du sud, la maturité cireuse prédominera.

Début juin, avec une combinaison favorable de chaleur et d'humidité, la végétation des cultures de printemps se développera. La formation des feuilles sera observée chez le maïs et le tournesol. Pour les cultures de tournesol semées pendant la période agrotechnique (Plovdiv, Haskovo, Lyubimets), la formation des inflorescences aura lieu.

Les précipitations attendues pendant la période maintiendront des conditions propices au développement des maladies fongiques : mildiou sur les cultures maraîchères ; pourriture brune tardive, tavelure et oïdium sur les arbres fruitiers ; mildiou et oïdium sur les vignes, ce qui nécessite une protection phytosanitaire opportune après la cessation des pluies.

Une probabilité accrue de grêle et un risque de verse des cultures et de dommages à la récolte de céréales sur pied sont prévus pour les derniers jours de la période.

*Source NIMH*