

Juillet – temps sec et chaud, ce qui entraînera un raccourcissement des périodes interphasiques dans les cultures agricoles.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 03.07.2024 Брой: 7/2024



Au cours de la première moitié de la première décade du mois, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par un temps instable. Les précipitations prévues en de nombreux endroits dans les zones de plaine du pays amélioreront temporairement les conditions pour le déroulement des processus de végétation des cultures de printemps.

Pendant la plupart des jours des deuxième et troisième décades de juillet, un temps relativement sec et chaud est attendu, ce qui entraînera un raccourcissement des périodes interphasiques. Un facteur limitant pour le développement du maïs et du tournesol sera le déficit en humidité du sol. Pour le maïs, diverses étapes seront observées – l'épiaison, la floraison de la panicule et l'apparition des soies. À la fin du mois, le début de la maturité laiteuse sera observé chez les hybrides précoces de maïs. Pour le tournesol, la floraison, la fécondation et le remplissage des graines auront lieu. Les valeurs maximales de température attendues entre 35 et 40°C auront un impact négatif sur les cultures pendant le stade reproductif.



Les températures élevées prévues en juillet et le temps relativement sec limiteront le développement des maladies fongiques dans les cultures agricoles, à l'exception des *oïdiums* dans les cultures pérennes et les cultures maraîchères. Les précipitations attendues autour et en dessous de la norme mensuelle nécessiteront l'application d'un régime d'irrigation accru.



Des conditions plus favorables pour effectuer les pulvérisations de protection des plantes (contre la deuxième génération de vers des fruits dans les vergers, contre l'acarien jaune de la vigne dans les vignobles) se présenteront au cours de la seconde moitié de la première décade, pendant la plupart des jours de la deuxième décade et à la fin du mois. Les traitements doivent être effectués pendant les heures les plus fraîches de la journée.

Dans les régions occidentales du pays, la probabilité de phénomènes locaux intenses et d'orages de grêle, ainsi que l'apparition de dégâts sur les cultures agricoles, reste élevée – verse des peuplements de céréales et égrenage du grain, blessures mécaniques sur les cultures de printemps, et sur les productions maraîchères et fruitières. La récolte du blé dans une grande partie des zones de plaine du pays se déroulera dans des conditions de risque accru d'incendies.

Source : NIMH