

Le

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.08.2024 Брой: 8/2024



Les températures extrêmement élevées de juillet et l'aggravation de la sécheresse ont causé des dommages irréparables au maïs et au tournesol par endroits dans les régions centrales, nord-est et sud du pays.

En août, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par des températures autour et au-dessus des normes climatiques. Le facteur limitant pour le développement des cultures agricoles tardives au cours du mois reste le déficit en humidité du sol. Les précipitations de fin juillet ont été inégalement réparties et, dans la majeure partie du pays, tardives et extrêmement insuffisantes pour combler le déficit hydrique des cultures agricoles tardives. Dans certaines régions occidentales et méridionales, les réserves en eau du sol dans les couches de 50 et 100 cm sont complètement épuisées. Une exception existe dans certains endroits de l'Est de

la Bulgarie, où fin juillet des précipitations de plus de 30-40 l/m² (Razgrad, Shumen, Ruse, Burgas, Chirpan) ont été enregistrées, humidifiant les couches supérieures du sol.

Les précipitations attendues durant la première quinzaine du mois par endroits dans l'Est de la Bulgarie ne conduiront pas à un changement substantiel de l'humidité du sol, ce qui nécessitera l'application d'un régime d'irrigation accru dans toute la zone agricole du pays.



*En août, l'activité nuisible des **acaridens** se poursuit, endommageant les tomates, les poivrons, les aubergines, les tomates, les cucurbitacées, les poireaux, les gombos, le céleri, le persil et autres.*

Durant la première décade d'août, une amélioration des conditions pour réaliser les travaux saisonniers de préparation du sol est attendue dans les régions orientales du pays. Au milieu de la période, une baisse de température de courte durée et des conditions plus propices à la réalisation des traitements phytosanitaires dans les cultures maraîchères et les plantations pérennes sont prévues – contre les oïdiums, les acaridens et les carpocapses.

Pendant la plupart des jours d'août, les prévisions météorologiques relativement sèches nécessiteront l'application de normes d'irrigation accrues pour les deuxièmes cultures et les hybrides de maïs tardifs, chez lesquels la formation et le remplissage du grain auront lieu. Des normes d'irrigation accrues seront également

nécessaires pour les variétés plus tardives d'arbres fruitiers et de vignes, qui sont en phase de grossissement des fruits.

Le professeur associé Simeon Krumov de l'Institut d'Agriculture – Kyustendil recommande l'irrigation pendant le grossissement des fruits et pendant la différenciation des bourgeons, à agrozona.bg. Les agronomes doivent surveiller strictement les arbres et, s'ils remarquent un enroulement des feuilles chez les arbres fruitiers dû à la chaleur, ils doivent prendre des mesures rapides. Dans ce cas, l'irrigation des plantations est impérative. Outre l'alimentation en eau par gravité, l'irrigation goutte-à-goutte et l'aspersion sont adaptées aux espèces fruitières pérennes.

Irrigation de la vigne

La vigne est une espèce relativement tolérante à la sécheresse, mais celle-ci l'affecte également sérieusement. Par conséquent, il est conseillé de suivre les recommandations des spécialistes de l'Institut de Viticulture et d'Œnologie de Pleven sur le moment d'irriguer les vignobles.



Cette année en août, plus tôt que les dates habituelles pour le pays, le développement des cultures de printemps tardives sera achevé. Des conditions thermiques supérieures à la normale et le déficit en humidité du sol durant la première moitié de l'été ont conduit à un raccourcissement des périodes interphasiques dans le

développement du maïs et du tournesol. Au début du mois d'août, la phase de maturation du tournesol sera observée dans la plaine du Danube et dans les régions méridionales. Durant la première décade, les hybrides précoces de maïs achèveront leur développement, et chez les hybrides mi-précoces, la phase de maturité laiteuse sera observée. Les hybrides de maïs mi-tardifs entreront en maturité cireuse au cours de la troisième décade du mois.

Les conditions météorologiques en août limiteront le développement des maladies fongiques, à l'exception des oïdiums sur les cultures maraîchères, les arbres fruitiers et la vigne. Au cours du mois, chez les variétés tardives d'arbres fruitiers, l'activité nuisible de la dernière génération de carpocapses ne doit pas être sous-estimée. Dans les zones viticoles, il est nécessaire de surveiller l'apparition et la densité des larves de la troisième génération de l'eudémis de la vigne.

Les traitements phytosanitaires en août doivent être effectués pendant les heures les plus fraîches de la journée avec des produits ayant un délai avant récolte approprié, en fonction de la période de maturation des cultures.

Source : NIMH