

Septembre – les conditions permettront la formation d'un rendement supplémentaire pour les cultures légumières tardives

Автор(и): Растителна защита

Дата: 07.09.2024 Брой: 9/2024



Durant la plupart des jours de la première décade de septembre, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par des températures supérieures aux normes climatiques, ce qui accélérera l'achèvement des derniers stades de développement des cultures tardives. Pour les hybrides de maïs tardif, les stades de maturité cireuse et de pleine maturité seront observés. Durant la première moitié de la période, dans les régions orientales, une probabilité plus élevée de précipitations est prévue, ainsi qu'une amélioration de l'humidité du sol dans les couches supérieures et des conditions pour réaliser le travail du sol pré-semis. Dans le reste des

zones de culture du pays, les conditions permettront la libération des terres après les récoltes de tournesol et de maïs arrivés à maturité.

Durant la deuxième décade du mois, un changement des conditions agrométéorologiques est attendu. Pour la plupart des jours de la période, une baisse relative des températures est prévue, ainsi que des conditions propices aux précipitations en plusieurs endroits des régions agricoles. Les précipitations attendues, suite à la sécheresse accentuée en fin d'été, amélioreront l'état des couches supérieures du sol et les conditions pour un travail du sol pré-semis et un semis de colza d'hiver de meilleure qualité. La période agrotechnique optimale pour le semis du colza se termine à la fin de la deuxième décade de septembre.

Les précipitations prévues durant la deuxième et la première moitié de la troisième décade augmenteront le risque de développement d'agents pathogènes fongiques dans les productions fruitières et légumières en maturation : pourriture grise sur les vignes, moniliose tardive sur les fruits des variétés d'arbres fruitiers tardives, mildious sur les cultures légumières.



Noctuelle de la tomate

En septembre, pour les cultures légumières de production tardive, les traitements phytosanitaires contre les chenilles de la troisième génération de la noctuelle de la tomate ne doivent pas être négligés, car elles causent des dégâts et détériorent la qualité du rendement légumier.

Durant la seconde moitié de la troisième décade, un temps sec et des conditions favorables sont attendus pour la récolte des vignes arrivées à maturité.

En septembre, des températures minimales critiques ne sont pas prévues, et les conditions permettront la formation d'une production supplémentaire à partir des cultures légumières tardives.

Source : NIMH