

Semis retardés du colza d'hiver et conditions d'infections et de développement des agents pathogènes dans les cultures agricoles tardives

Автор(и): Растителна защита

Дата: 18.09.2024 Брой: 9/2024



Après la sécheresse prolongée, début septembre, des précipitations économiquement significatives de plus de 30–40 l/m² sont tombées dans de nombreuses régions du pays (Silistra, Varna, Dobrich, Stara Zagora, Burgas, Haskovo, Sandanski).

Ces précipitations sont arrivées tard, même pour les cultures de plein champ tardives qui, en raison du déficit hydrique du sol et des températures estivales supérieures à la normale, ont achevé leur développement bien plus tôt que les délais habituels.

Au cours de la semaine actuelle également, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par un temps instable. Des précipitations sont prévues pour la période, améliorant les réserves en eau des couches supérieures du sol et les conditions pour réaliser les travaux saisonniers de préparation des sols.

En raison de la sécheresse, le travail du sol avant semis des parcelles destinées à l'ensemencement du colza d'hiver, une culture exigeant une préparation précise du sol, a été reporté. Pour cette raison, dans de nombreuses régions du pays, le semis du colza sera effectué après les délais agrotechniques optimaux. Ceux-ci expirent à la fin de la deuxième décade de septembre.

La plupart des jours de la période, le temps frais prévu avec des précipitations fréquentes créera des conditions propices aux infections et au développement d'agents pathogènes dans les cultures agricoles tardives : la pourriture brune tardive sur les arbres fruitiers, la pourriture grise sur les raisins, le mildiou sur les cultures maraîchères.



Au cours de la deuxième décade de septembre, dans les choux cultivés pour la production d'automne, il convient de surveiller les ravageurs : les chenilles de la piéride du chou, de la teigne du chou, de la teigne des crucifères, et lorsque leur densité dépasse le seuil économique de nuisibilité (3–5 chenilles par plante), un traitement avec des insecticides à court intervalle avant récolte est nécessaire.

La période à venir est propice aux semis d'épinards et d'autres légumes-feuilles pour la production d'automne.

Source : NIMH