

Octobre – précipitations d'importance agronomique et bonnes conditions pour le développement du colza d'hiver

Автор(и): Растителна защита

Дата: 06.10.2024 Брой: 10/2024



En octobre, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par des températures autour et au-dessus des normes climatiques et des précipitations proches des moyennes mensuelles. Après la sécheresse estivale, les pluies économiquement significatives de septembre, dans certaines zones de l'Est et par endroits dans l'Ouest de la Bulgarie, ont amélioré l'humidité des couches supérieures du sol et les conditions pour réaliser les travaux saisonniers de préparation des sols.

Les précipitations de fin septembre ont été inégalement réparties. En de nombreux endroits du centre et du nord-est de la Bulgarie, des précipitations allant jusqu'à et au-dessus de 30-35 l/m² ont été enregistrées (Veliko Tarnovo - 40 l/m², Ruse - 43 l/m², Razgrad - 36 l/m², Silistra - 45 l/m², Varna - 45 l/m², Dobrich - 53 l/m²), ce qui a conduit à une amélioration substantielle des réserves en eau dans les couches supérieures du sol et des conditions pour mener les travaux saisonniers de préparation des sols. Contrairement aux régions centrales et orientales, dans certaines parties de l'Ouest et du Sud de la Bulgarie, les pluies du début de l'automne n'ont pas eu d'importance économique. Dans ces parties du pays, le sol sec et compacté entrave sérieusement le labour profond et la préparation pré-semis des parcelles destinées aux semis de cultures d'hiver.

Pendant la plupart des jours de la première décade d'octobre, des précipitations significatives ne sont pas prévues et les conditions permettront la préparation des champs et leur ensemencement avec des céréales d'hiver. La sécheresse estivale a entravé les semis en temps voulu du colza d'hiver et, par endroits dans les régions arables du centre de la Bulgarie, les parcelles seront semées en dehors du calendrier agrotechnique. Il est très probable que les peuplements semés tardivement n'entreront pas dans le stade rosette durant leur végétation automnale, ce qui garantit l'hivernage réussi de la culture sans dommage.

En octobre ont lieu les périodes agrotechniques optimales pour les semis des céréales d'hiver. Le calendrier pour le nord de la Bulgarie se situe dans la première quinzaine du mois, pour le sud de la Bulgarie dans la seconde quinzaine, et pour les régions de la mer Noire au cours de la troisième décade. Les précipitations attendues à la fin de la première et au début de la seconde décade, ainsi que pendant la seconde moitié de la troisième décade du mois, seront d'une importance significative pour le déroulement normal des stades initiaux de la végétation du blé et de l'orge. En octobre, selon les dates de semis, les stades suivants seront observés chez le blé – levée, première et troisième feuille.



Le temps chaud prévu dans la seconde moitié du mois sera un facteur propice à l'augmentation de la population du campagnol des champs. Les parcelles avec des cultures semées en automne doivent être surveillées, et lorsque le seuil économique d'infestation est atteint – SEI : 2 colonies actives/100 ares – un traitement doit être appliqué.

Des conditions favorables aux travaux des champs existeront au milieu de la seconde et pendant la première moitié de la troisième décade, lorsqu'un temps relativement sec est prévu.



En octobre, dans les vergers de pommiers et de poiriers touchés par la tavelure, afin de réduire l'infection, il est conseillé au début de la chute des feuilles, après la récolte des fruits, d'effectuer un traitement avec une solution d'urée à 5%.

Pour les espèces à noyau, après la chute massive des feuilles, une pulvérisation avec une bouillie bordelaise à 2% est recommandée contre les agents responsables de la criblure, de la moniliose précoce et de la cloque du pêcher.

Au début du mois d'octobre, des gelées au sol sont prévues, ce qui limitera les possibilités de production supplémentaire pour les légumes tardifs sensibles aux dégâts du gel.

Source : INMH