

Activités de protection des plantes dans le verger en octobre

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 08.10.2024 Брой: 10/2024



Début octobre, des gelées sont prévues.

En octobre, dans les vergers de pommiers et de poiriers touchés par la tavelure, afin de réduire l'infection, il est conseillé, au début de la chute des feuilles et après la récolte des fruits, d'effectuer un traitement avec une solution d'urée à 5%.

Pour les espèces à noyau, après la chute massive des feuilles, une pulvérisation avec une bouillie bordelaise à 2% est recommandée contre les agents responsables du criblure, de la pourriture brune précoce et de la cloque du pêcher.

Dans les vergers

Des nichoirs et des mangeoires sont placés dans les arbres fruitiers pour attirer les oiseaux bénéfiques.

Les bandes pièges en carton ondulé contenant les chenilles présentes du carpocapse, de la tordeuse du prunier et de la teigne du noyer sont collectées et placées dans des cages suspendues dans les vergers – les pics et autres oiseaux détruisent les chenilles dans les bandes.



Sur le tronc de chaque arbre dans les vergers infestés par les phalènes hivernales, une bande engluée est placée à une hauteur de 20 à 100 cm. Les bandes sont en papier de 20 cm de large, avec les bords supérieur et inférieur attachés. Un adhésif à séchage lent est utilisé pour l'enduction. Pour empêcher les insectes de se cacher avant d'atteindre la bande, l'écorce fissurée de la bande jusqu'à la surface du sol est grattée à l'avance.

Les fruits des pommiers et des poiriers sont inspectés aux points de tri et de manutention pour détecter la présence de la cochenille rouge de Californie et de la cochenille du mûrier dans les zones non infestées.



Les nids de chenilles de l'hyphantrie cendrée sont comptés afin de déterminer la densité de population du ravageur.



La secousse des arbres, commencée fin septembre, se poursuit afin de déterminer la densité de population du charançon du bourgeon du poirier. Lorsque la densité dépasse le seuil économique, avant la ponte, les arbres sont pulvérisés avec un insecticide de contact de n'importe quel groupe – Decis 100 EC (12,25 ml/da) ou un autre produit à base de deltaméthrine, Sumi Alpha 5 EC (0,03%), Karate Zeon 5 SC (15 ml/da), Lamdex extra (100–120 g/da) et autres.

Les vergers de poiriers sont pulvérisés contre le psylle du poirier avec l'un des insecticides – Bermectin (40–120 ml/da) ou un autre produit à base d'abamectine, Voliam Targo 063 SC (75 ml/da), Imidan 50 WG (150 g/da), Delegate 250 WG (30 g/da), Deka EC (50 ml/da) ou un autre produit à base de deltaméthrine, Movento 100 SC (0,12–0,15%), Naturalis (100–200 ml/da), Sineis 480 SC (30–44 ml/da), Flipper (1–2 l/da).



Les pousses avec des pucerons lanigères parasités par la guêpe parasitoïde *Aphelinus mali* sont coupées et stockées dans un endroit frais et à l'ombre sous un abri. Les pucerons lanigères contenant cette guêpe sont de couleur noire et n'ont pas de trou de sortie. Au printemps de l'année suivante, ils sont utilisés pour la lutte biologique.