

Au début du mois de décembre, les précipitations attendues augmenteront les réserves d'humidité dans les couches supérieures du sol.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 01.12.2024 Брой: 12/2024



Au cours de la période de sept jours à venir, les conditions agrométéorologiques vont subir un changement substantiel. En Bulgarie occidentale, une baisse significative des températures est prévue, mais sans valeurs minimales critiques pour les cultures d'automne qui accusent un retard dans leur développement. La vague de froid début décembre entraînera un ralentissement, et dans les champs plus élevés, où la formation d'un couvert neigeux est attendue, un arrêt des processus de végétation des cultures céréalières d'hiver.

Dans la plupart des régions orientales et méridionales, les températures moyennes quotidiennes prévues seront proches du minimum biologique requis pour le développement des cultures céréalières d'hiver. Des conditions de végétation pour les cultures d'automne se développeront dans les régions le long de la côte de la mer Noire, où des températures plus élevées sont prévues.

Les précipitations attendues au cours de la période augmenteront les réserves d'humidité du sol dans les couches supérieures du sol. Ces précipitations arriveront trop tard pour une partie des cultures dans certains endroits des régions centrales et méridionales, où, en raison d'un déficit d'humidité du sol, les céréales d'hiver germées n'ont pas pu lever. Suite à la sécheresse automnale prolongée, une grande partie des cultures céréalières d'hiver est mal implantée, à un stade initial de développement, et les peuplements présentent une densité inégale. Au début du mois de décembre, les stades suivants seront observés dans le blé : levée, 1–2 et 3 feuilles. Une petite partie des peuplements dans les régions du nord-est, où l'humidité durant la première moitié de l'automne n'a pas été un facteur limitant, est au stade du tallage (la région de Provadia) – le stade approprié pour l'hivernage.

Pendant cette période, des conditions plus favorables à la plantation d'arbres fruitiers se présenteront dans les régions orientales du pays.

Source NIMH