

Début février, les cultures d'automne sont en bon état.

*Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.02.2025 Брой: 2/2025*



Les températures exceptionnellement élevées de la dernière semaine de janvier, atteignant 17-18°C dans de nombreuses régions du pays, et dans certaines zones du nord de la Bulgarie – jusqu'à et au-dessus de 20°C (Vratsa - 22°C, Pleven - 22°C, Lovech - 22°C, Veliko Tarnovo - 23°C, Silistra - 20°C), ont conduit à la reprise des processus végétatifs dans les cultures semées à l'automne sur une partie des surfaces du pays. Les températures de janvier supérieures à la normale ont également perturbé la dormance de certaines espèces d'arbres.

Les cultures semées à l'automne en Dobroudja sont dans un bon état général, rapporte le Prof. Dr. Ivan Kiryakov, chef du département «Amélioration des céréales et des légumineuses à grains» à l'Institut agricole de

Dobroudja – General Toshevo. Le blé, selon la date de semis, se trouve à différents stades de son développement - certaines cultures sortent du tallage, d'autres sont au début de la phase. Son conseil est de reporter la fertilisation à la seconde moitié de février.

Les cultures du sud de la Bulgarie se développent également normalement et sont au stade du tallage. Aucun dégât dû aux maladies, aux ravageurs ou au gel hivernal du blé n'a été observé, nous a partagé le Prof. associé Dr. Evgeniy Dimitrov de l'Institut des ressources génétiques végétales «K. Malkov» à Sadovo. Là-bas, la fertilisation azotée du blé commence généralement début février.

Un facteur limitant pour le développement des cultures dans tout le pays est l'humidité de la couche du sol, qui dans les conditions des régions méridionales du pays ces dernières années a été caractérisée par des niveaux très bas, bien en dessous de la norme.

Après le temps anormalement doux, vers la fin de la semaine, les conditions agrométéorologiques vont subir un changement, qui sera substantiel dans la seconde moitié de la période. La vague de froid attendue stoppera la végétation prématurée des céréales d'hiver et freinera le développement indésirable initial des arbres fruitiers.

Au cours de la période, des températures minimales critiques pour l'hivernage des cultures agricoles ne sont pas prévues.

Des conditions plus propices pour réaliser le travail du sol et la taille dans les vignobles et les vergers se présenteront au début de la période.

photo© bluedesign - Fotolia.com

Source : NIMH et Agri.bg