

Début mars, les précipitations et les chutes de neige augmenteront le niveau des réserves en eau du sol.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 02.03.2025 Брой: 3/2025



Les températures minimales basses enregistrées au cours de la période de sept jours écoulée, atteignant par endroits dans le nord-ouest de la Bulgarie et dans les champs des hautes vallées jusqu'à et en dessous de moins 13-14°C à Vidin, Kneja, Dragoman et Kazanlak, ont mis à l'épreuve la résistance au froid des cultures d'automne sous-développées dans des conditions sans couverture neigeuse. Des valeurs de cet ordre, lorsqu'elles se maintiennent sur une période plus longue, sont critiques pour les cultures céréalières d'hiver en phase d'hivernage au stade 2-3 feuilles.

Dans les régions du nord-ouest, des inspections sur le terrain des cultures aux stations agrométéorologiques de Băzovec, Kneja, Kyustendil et Kazanlak sont à venir pour évaluer les dommages potentiels dus au gel.

Les températures extrêmement basses de la dernière semaine de février ont eu un effet dévastateur sur les vergers de la région de Ruse–Silistra. À certains endroits, les températures sont tombées à moins 24 degrés, ce qui a entraîné le gel d'une grande proportion des bourgeons fruitiers des abricotiers, partage Nikolay Kolev – Président de l'Union des arboriculteurs du Danube – Ruse. Des dégâts dus au gel sont également observés sur les cerisiers, pêchers, pruniers, pommiers et poiriers.

Fin février et début mars, les températures seront inférieures aux normes climatiques, ce qui maintiendra l'état de dormance des cultures semées à l'automne. Les valeurs minimales prévues sont supérieures aux seuils critiques pour les cultures agricoles en hivernage.

Les précipitations attendues de pluie et de neige augmenteront le niveau des réserves en humidité du sol dans la couche de 50 cm. En raison de précipitations inférieures à la normale en janvier et dans la première quinzaine de février, les réserves en humidité du sol dans la couche de 100 cm sont insatisfaisantes pour cette période de l'année dans la majeure partie du pays. Une probabilité accrue de formation d'un manteau neigeux et d'une amélioration des conditions d'hivernage pour les cultures semées à l'automne est prévue à la fin de la semaine prochaine.

Source : NIMH