

En mars, les températures seront autour et au-dessus des normes climatiques, et les précipitations autour et en dessous des normes.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 09.03.2025 Брой: 3/2025



Durant la première moitié de la première décade, les températures prévues seront dans des fourchettes qui freineront le développement des cultures agricoles.

Durant la seconde moitié de la décade, une augmentation substantielle des températures est attendue et leurs valeurs moyennes journalières atteindront et dépasseront le minimum biologique requis pour la reprise des processus végétatifs chez les céréales d'hiver.

Les températures supérieures aux normales prévues durant la deuxième décennie de mars stimuleront la végétation des peuplements semés à l'automne. Durant cette période, une partie des peuplements de blé et d'orge actuellement au stade trois feuilles entrera en phase de tallage.

Les températures maximales attendues, allant jusqu'à 20°C et au-delà, activeront également les processus végétatifs chez une grande partie des cultures pérennes. Chez les arbres fruitiers, les stades de gonflement et de débourrement des bourgeons se dérouleront chez les espèces à floraison précoce (amandier, abricotier, pêcher). Dans les vignobles des zones de plaine, on observera la montée de sève.

Les conditions durant la période seront favorables à la fertilisation de couverture des cultures d'hiver avec des engrais minéraux azotés, à la réalisation des travaux de préparation du lit de semence et aux semis des cultures de printemps précoces (vesce, pois, orge de printemps).

Au début de la deuxième décennie de mars, aucune précipitation n'est attendue, ce qui offrira une opportunité pour la mise en œuvre en temps utile des traitements préventifs pré-floraison dans les vergers avec des fongicides à base de cuivre contre les agents responsables de la pourriture des fleurs, de la cloque du pêcher, de la tavelure et d'autres pathogènes.

Durant la troisième décennie, les températures attendues, autour et au-dessus des normes climatiques, maintiendront des processus végétatifs actifs dans les cultures agricoles. À la fin du mois, chez les céréales d'hiver ayant tallé à l'automne, une augmentation du coefficient de tallage sera observée.

En mars, chez les arbres fruitiers, les stades de gonflement et de débourrement des bourgeons se dérouleront. À la fin du mois, chez les espèces à floraison précoce – amandier, abricotier et pêcher – le stade du bouton floral sera observé, et dans certains endroits des régions méridionales – le début de la floraison. Dans les vignobles des zones de plaine, on observera la montée de sève.

Durant le mois, les températures minimales prévues, pouvant descendre jusqu'à moins 7°C, présenteront un risque pour les arbres fruitiers aux stades du bouton floral et de la floraison.

Les précipitations de mars augmenteront les réserves en eau du sol dans la couche de 100 cm. Fin février, dans la majeure partie du pays, à l'exception de certains endroits des régions orientales, le niveau des réserves hydriques du sol pour les céréales d'hiver dans la couche d'un mètre est faible pour la saison – dans certaines parties de la plaine danubienne et des régions méridionales, il est inférieur à 70% de la capacité au champ

(CC). Habituellement, à la fin de l'hiver, dans les années sans anomalies climatiques, les réserves hydriques du sol dans la couche d'un mètre atteignent des niveaux allant jusqu'à la CC.

En mars, des conditions plus favorables pour la réalisation des travaux de préparation du lit de semence des parcelles destinées aux semis de cultures de printemps précoces et mi-précoces se présenteront durant la seconde moitié du mois. À la mi-mars, la période agrotechnique (15-20.03) pour le semis du tournesol dans le sud de la Bulgarie commence, et au milieu de la troisième décade (25.03–5.04) – dans la plaine danubienne.

Source : INMH