

Avril – temps instable et précipitations d'importance agricole

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.04.2025 Брой: 4/2025



En avril, les conditions agrométéorologiques se caractériseront par une dynamique accrue. Durant la plupart des jours du mois, elles seront déterminées par un temps instable. Les précipitations attendues, autour et au-dessus des normes climatiques, maintiendront de bonnes réserves d'humidité du sol dans la couche de 50 cm et les conditions pour la végétation des céréales d'hiver et des cultures de printemps semées. C'est ce qui est indiqué dans les prévisions mensuelles des agrométéorologues du NIMH.

Durant la première quinzaine d'avril, la végétation des cultures agricoles se déroulera avec des températures moyennes journalières autour et en dessous des normes climatiques. Dans la première décade, le blé dans les zones de plein champ entrera dans le stade de l'élongation des tiges.

Durant la deuxième décade, des températures minimales négatives allant jusqu'à moins 2-3°C sont prévues, avec un risque accru de dommages aux fleurs et aux jeunes fruits des arbres fruitiers. Les dernières gelées printanières sont attendues à la fin de la décade, ce qu'il convient de prendre en compte lors de l'endurcissement des plants de légumes.

Les maladies de la septoriose sur le blé d'hiver

Une augmentation des températures moyennes journalières et une accélération des rythmes de développement des cultures agricoles sont prévues à la fin de la deuxième et durant la troisième décade. Durant cette période, le blé effectuera une transition de l'élongation des tiges à l'épiaison et au stade de l'épiaison. La période interphase élongation des tiges – épiaison est critique pour l'infection des céréales d'hiver par la septoriose.



Les peuplements de blé doivent également être surveillés pour la présence de ravageurs – le criocère des céréales, la punaise des blés, et, à des densités supérieures au seuil économique de nuisibilité, un traitement en temps opportun est nécessaire.



Tavelure du pommier

Les précipitations fréquentes durant le mois créeront des conditions favorables à une augmentation du fond infectieux d'un certain nombre de maladies fongiques sur les cultures fruitières – la pourriture brune précoce (moniliose des fleurs), la tavelure, le criblure, la cloque du pêcher, etc. Durant la première moitié de la troisième décade, une probabilité accrue d'orages de grêle est prévue. Les arbres fruitiers touchés par la grêle doivent être traités avec des fongicides à base de cuivre à la première occasion afin de limiter le risque d'infections secondaires par des agents pathogènes.

En avril, des conditions plus favorables pour réaliser les traitements phytosanitaires se présenteront au début et à la fin de la deuxième décade et durant la seconde moitié de la troisième décade.

Au début de la troisième décade, la température du sol dans la couche de 10 cm atteindra des valeurs favorables pour le semis du maïs, et à la fin avril – également pour les cultures de printemps thermophiles (coton, haricots, arachides, pastèques, melons, etc.).