

Contrôle express des mauvaises herbes pour des rendements élevés en tournesol

Автор(и): ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ

Дата: 16.04.2025 Брой: 4/2025



Les herbicides de FMC Agro Bulgarie – Express® 50 SG et Evorelle® Express® – assurent une protection sélective et des champs propres dès les premiers stades de croissance du tournesol.

Les herbicides Express® 50 SG et Evorelle® Express® sont destinés à la lutte sélective contre les mauvaises herbes dicotylédones dans les **hybrides de tournesol tolérants à Express® et Evorelle® Express®**. Il est extrêmement important que les herbicides soient **appliqués uniquement sur des hybrides tolérants**, la liste étant disponible sur le site web de FMC. Pour plus d'informations, veuillez consulter les représentants commerciaux de FMC.

Express® 50 SG et Evorelle® Express® sont les seuls herbicides homologués pour une utilisation sur un grand nombre d'hybrides de tournesol tolérants à Express® 50 SG / Evorelle® Express®.

Express® 50 SG – une efficacité éprouvée contre les principales mauvaises herbes dicotylédones du tournesol

Express® 50 SG est un herbicide systémique de post-levée qui assure une lutte fiable contre les mauvaises herbes dicotylédones les plus répandues et difficiles à contrôler dans le tournesol, telles que le **chardon des champs**, le **liseron des champs**, l'**amarante**, le **stramoine**, le **chénopode blanc**, l'**ansérine** et autres. La croissance des adventices s'arrête seulement quelques heures après le traitement, et leur destruction complète intervient dans les 15 à 25 jours.

Pour garantir l'efficacité totale du produit, l'adjuvant Trend® 90 doit être ajouté à la bouillie de pulvérisation. Le traitement de plantes stressées n'est pas recommandé.

Evorelle® Express® – une nouvelle solution pour des défis sérieux

Evorelle® Express® est un herbicide à action combinée, destiné à la lutte efficace contre les mauvaises herbes dicotylédones résistantes dans le tournesol. Evorelle® Express® est particulièrement adapté dans des conditions où se propagent des adventices difficiles à contrôler telles que l'**apocynum**, le **chardon des champs**, le **stramoine**, le **chénopode blanc**, le **sorgho d'Alep** et diverses **espèces d'ansérine**. Le produit pénètre rapidement dans les tissus des mauvaises herbes, bloquant les processus enzymatiques liés à la croissance. Les symptômes visibles apparaissent dans les dix jours suivant le traitement, et la destruction des espèces sensibles intervient dans les 15–25 jours.

La lutte contre les mauvaises herbes crée un environnement favorable, mais la croissance nécessite également une nutrition équilibrée. Les engrais foliaires et biostimulants FMC – **Rhizomagic**, **Seamac™ OR**, **Nuvola™ AMIN** et **BO-LA™** – fournissent aux plantes les nutriments nécessaires, les acides aminés et les composés bioactifs qui soutiennent la croissance, augmentent la tolérance et compensent les conditions de stress. Certains d'entre eux, dont Rhizomagic, Seamac™ OR et Nuvola™ AMIN, figurent sur la liste de l'Agence bulgare de sécurité alimentaire (ABSA) des engrais organiques et organo-minéraux homologués et sont **adaptés à une utilisation dans le cadre des éco-régimes**.