

Fin avril – temps instable avec des précipitations et conditions propices à la formation de gelées

Автор(и): Растителна защита
Дата: 26.04.2025 Брой: 4/2025



Fin avril, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par un temps instable et des températures proches des normes climatiques pour la troisième décennie d'avril. Les précipitations de la fin de la période passée ont augmenté les réserves en humidité des couches supérieures du sol en de nombreux endroits des régions occidentales. Durant les premiers jours de la période, des précipitations sont prévues, ce qui améliorera également les conditions pour la végétation des cultures agricoles dans les régions orientales du pays.

Le développement des céréales d'hiver et des cultures de printemps semées se poursuivra, dans la seconde moitié de la période, sous des conditions thermiques inférieures à la normale. Fin avril, le stade de la montaison prévaudra massivement chez le blé. Début mai, chez l'orge, le début de l'épiaison sera également observé dans

certaines endroits des régions de plaine. Dans les peuplements semés de tournesol et de maïs, selon les dates de semis, la levée et la formation initiale des feuilles auront lieu.

Ravageurs du maïs



Charançon gris du maïs (Tanymecus dilaticollis Gyll.)

Dans les stades initiaux de la végétation du maïs et du tournesol, les peuplements doivent être surveillés pour détecter la présence d'un ravageur dangereux – le charançon gris du maïs. Lorsque la densité du ravageur dépasse le seuil de nuisibilité économique (SNE), les cultures doivent être traitées dès la première occasion avec l'un des insecticides homologués (SNE au stade levée : tournesol – 2 charançons par m² ; maïs > 2 charançons par m²).



Mildiou de la vigne (Plasmopara viticola)

Chez la vigne, la formation de la 2ème à la 3ème feuille aura lieu, et dans les régions extrême sud, l'apparition des inflorescences. Durant cette période, il est conseillé d'effectuer un traitement préventif des vignes contre les agents responsables du mildiou et de l'oïdium.

Pratiques de protection des plantes dans les cultures légumières en avril

Fin avril, une baisse substantielle des températures minimales et des conditions de gel sont prévues, ce qui doit être pris en compte lors de la plantation des plants de légumes dans les jardins.