

En mai, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par un temps instable avec des températures et des précipitations proches des normes climatiques pour le mois.

*Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.05.2025 Брой: 5/2025*



Après les températures plus fraîches que la normale du début mai, une amélioration des conditions thermiques et une accélération des processus végétatifs des cultures agricoles sont prévues pour le milieu de la première décade. Durant cette décade, des précipitations d'importance agronomique et une amélioration des réserves en eau du sol sont attendues – d'une importance cruciale pour le déroulement normal des phases reproductives

dans le développement des céréales d'hiver. Pour le blé et l'orge, on observera la montaison, la transition vers l'épiaison et l'épiaison, principalement dans certaines localités des régions orientales et méridionales du pays. Pour le maïs et le tournesol, la levée et la formation initiale des feuilles auront lieu. Durant cette période, il est nécessaire de surveiller les cultures céréalières d'hiver pour les ravageurs : punaise des blés, chrysomèle des céréales, puceron des céréales, et lorsque leur densité de population dépasse le seuil économique de nuisibilité, un traitement doit être effectué à la première occasion.

Dans les vignobles, il faut surveiller l'apparition des chenilles de la première génération de l'eudémis de la vigne et les dégâts causés par les acariens (acariose bronzée).

Les précipitations fréquentes durant la période créeront des conditions favorables au développement des maladies fongiques. Une augmentation des infections primaires de mildiou dans les vignobles est attendue, ce qui nécessite des pulvérisations préventives en temps opportun après la stabilisation du temps.

Durant les premiers jours de mai, les températures du sol à une profondeur de 10 cm dans les zones de plein champ du pays seront à des niveaux appropriés pour les semis des cultures de printemps thermophiles : coton, arachides, haricots, pastèques, melons, etc.



Durant la deuxième et la première moitié de la troisième décade, le développement des cultures agricoles se poursuivra à un rythme modéré. Les précipitations attendues maintiendront de bonnes réserves en eau du sol et les conditions nécessaires à la formation et au remplissage des grains du blé et de l'orge. Durant cette période, les céréales d'hiver ont des besoins élevés en eau du sol.

Les températures prévues au-dessus des normales dans la seconde moitié de la troisième décade accéléreront le développement des cultures agricoles. Fin mai, dans certaines localités des régions orientales et méridionales, le début du stade laiteux du blé et de l'orge sera observé.

Pour le maïs et le tournesol, la formation des feuilles aura lieu. Les cultures de tournesol semées dans la période agrotechnique recommandée atteindront le stade du bouton floral fin mai.

L'oïdium dans les cultures maraîchères de la famille des Solanacées



En mai, dans les cultures fruitières non touchées par les gelées printanières, la formation et l'agrandissement des fruits noués auront lieu. Dans les vignobles, on observera la séparation des inflorescences, et à la fin du mois – le stade de la floraison. Ces stades sont critiques pour les infections de mildiou et d'oïdium.

Les rouilles du blé tendre d'hiver

Les précipitations fréquentes en mai créeront des conditions propices à l'augmentation du fond infectieux de plusieurs maladies fongiques : dans le blé – les rouilles (brune, jaune) et la fusariose de l'épi ; les mildious dans les cultures maraîchères et les vignobles.



Rouille brune des feuilles du blé

À la fin de la première et au début de la deuxième décade, la possibilité de formation de gelées ne peut être exclue, ce qui doit être pris en compte lors du repiquage des plants de légumes.

Durant la deuxième décade de mai, une probabilité accrue d'orages de grêle est prévue. En cas de dégâts de grêle, il est conseillé de traiter les cultures affectées à la première occasion avec des fongicides à base de cuivre pour favoriser une cicatrisation plus rapide des blessures et réduire le risque d'infections secondaires par des agents pathogènes.

Protection des plantes dans les vignobles en mai

En mai, la surveillance des cultures céréalières d'hiver pour les ravageurs doit se poursuivre : punaise des blés, chrysomèle des céréales, et lorsque leur densité de population dépasse le seuil économique de nuisibilité, un traitement doit être effectué à la première occasion.



Dans les vignobles, il est nécessaire de surveiller l'apparition des chenilles de la première génération de l'eudémis de la vigne et les dégâts causés par les acariens (acariose bronzée).