

Au cours de la dernière semaine de mai, le développement des cultures agricoles se déroulera sous des températures inférieures aux normes climatiques et avec des précipitations utiles.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 26.05.2025 *Брой:* 5/2025



Au cours de la période de sept jours à venir, les conditions agrométéorologiques continueront d'être déterminées par un temps instable. Des précipitations d'importance agronomique sont prévues pour la période, ainsi qu'une amélioration des réserves en eau du sol, même dans les couches plus profondes.

Les précipitations des première et deuxième décades de mai ont été inégalement réparties. En de nombreux endroits du sud de la Bulgarie, les précipitations de mai ont atteint et dépassé les normales mensuelles (Blagoevgrad, Haskovo, Kardzhali, Elhovo, Chirpan, Karnobat, Bourgas). Dans une partie des régions du sud, les réserves en eau du sol dans les couches de 50 et 100 cm ont atteint des niveaux allant jusqu'à et au-dessus de 85% de la capacité au champ (CC), ce qui est optimal pour le développement des cultures céréalières d'hiver et des cultures de printemps semées.

Contrairement aux régions du sud, dans certains endroits du nord-est de la Bulgarie (station agrométéorologique de Silistra), en raison de précipitations inférieures à la normale en avril et dans la première quinzaine de mai, le niveau des réserves en eau du sol pour les céréales d'hiver à la fin de la deuxième décade est faible – inférieur à 65% de la CC.

Au cours de la dernière semaine de mai, une amélioration substantielle des réserves en eau du sol est attendue dans les régions du nord-est, ce qui est d'une grande importance pour les céréales d'hiver, qui ont des besoins élevés en eau du sol.

Au cours de la période, le développement des cultures agricoles se poursuivra à des températures inférieures aux normes climatiques. D'ici la fin mai, la formation et le remplissage des grains auront lieu dans les cultures céréalières d'hiver.



Au cours de cette période interphasique, les dégâts sur le blé sont causés par les larves de la punaise des blés, ce qui nécessite une inspection des peuplements sur le terrain, et lorsque la densité du ravageur dépasse le seuil de nuisibilité économique (2 larves/m²), un traitement doit être effectué à la première occasion.

Chez le tournesol et le maïs, la formation des feuilles se poursuivra.

À la fin du mois de mai, la floraison des inflorescences prédominera dans la vigne, un stade critique pour l'infection par le mildiou et l'oïdium.

Au cours de la dernière semaine de mai, l'humidité accrue des couches supérieures du sol limitera la réalisation des opérations culturales saisonnières. Des chutes de grêle sont attendues pendant la période. Pour les arbres fruitiers, les cultures maraîchères et les vignobles touchés par la grêle, il est conseillé d'effectuer des traitements avec des fongicides à base de cuivre pour réduire le risque d'infections secondaires par des agents pathogènes.

Source : INMH