

Durant la dernière décade de juin, la végétation des cultures de printemps se développera sous des températures élevées et un déficit hydrique du sol.

*Автор(и): Растителна защита
Дата: 24.06.2025 Брой: 6/2025*



Après les températures élevées de la mi-juin, qui ont atteint et dépassé 35-36° dans certaines régions du sud, aucun changement des conditions agrométéorologiques n'a été observé. Les précipitations attendues au début de la période seront sans importance économique. En raison de précipitations inférieures à la normale et de températures supérieures à la normale au cours des première et deuxième décades de juin, les réserves en eau du sol pour les cultures de printemps ont considérablement diminué. Dans certaines régions du sud, le niveau

des réserves en eau dans la couche de 50 cm pour le maïs et le tournesol est inhabituellement bas pour le début de l'été - en dessous de 60% de la capacité au champ.

Pendant la plupart des jours de la période à venir, la végétation des cultures de printemps se déroulera à des températures proches et supérieures aux normes climatiques pour la troisième décade de juin, et dans de nombreuses régions agricoles – également avec un déficit en eau du sol. C'est la troisième année consécutive avec une sécheresse marquée pendant les mois d'été, ce qui est préjudiciable aux cultures de maïs et de tournesol.

Au cours de la période, la formation des inflorescences se produira chez les tournesols.



L'attaque du charançon gris du maïs est particulièrement dangereuse pour les cultures de printemps. Des scientifiques de l'Institut agricole – Shumen ont mené une enquête sur les champs de maïs et de tournesol dans les régions de Veliko Tarnovo, Targovishte, Ruse, Razgrad et Shumen et ont constaté des dommages importants causés par le ravageur.

La formation des feuilles se produira chez le maïs. Fin juin, le début de la phase de floraison mâle (panicule) sera observé chez les hybrides de maïs précoces.

Au cours de la troisième décennie de juin, l'inspection des cultures de maïs pour la présence de l'un des ravageurs les plus dangereux – la pyrale du maïs – devrait se poursuivre, et si les effectifs dépassent le seuil économique (10 masses d'œufs pour 100 plantes), un traitement insecticide contre les larves est nécessaire avant qu'elles ne s'introduisent dans les tiges.

La Pyrale du Maïs (*Ostrinia nubilalis* Hübner) – un Important Ravageur Économique du Maïs

Au cours de la période, la maturité cireuse et la pleine maturité seront observées chez le blé dans les régions agricoles. Pour les cultures situées dans les champs en altitude, la maturité laiteuse et une transition vers la maturité cireuse se produiront.

Des températures maximales élevées et un risque d'incendies pendant la récolte des céréales sont prévus.