


Le facteur limitant pour le développement des cultures agricoles tardives en août reste le déficit en humidité du sol

Автор(и): Растителна защита

Дата: 05.08.2025 *Брой:* 8/2025



En août, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par des températures supérieures aux normes climatiques et des précipitations – autour et en dessous de la norme mensuelle. Le déficit en humidité du sol restera un facteur limitant pour le développement des cultures agricoles tardives en août également.

Les précipitations tombées fin juillet, suite à l'aggravation de la sécheresse, étaient locales et insuffisantes pour combler le déficit hydrique dans les cultures agricoles tardives. Dans la plupart des régions de plaine, l'humidité productive est absente dans les couches de sol de 50 et 100 cm.

Pendant la plupart des jours d'août, le temps relativement sec prévu nécessitera l'application de taux d'irrigation accrus pour les deuxièmes cultures et les hybrides de maïs tardifs. Des taux d'irrigation accrus seront également requis pour les arbres fruitiers, qui sont en train de former les bourgeons floraux pour l'année suivante.

La nouvelle génération d'hybrides de tournesol de DAI est un format hautement intensif pour la gestion du rendement

En août, plus tôt que les délais habituels pour le pays, le développement des cultures de printemps tardives sera achevé. Début août, dans les cultures de tournesol du sud de la Bulgarie, on observera la maturité technique (Plovdiv, Haskovo, Sliven, Yambol), et à la fin de la première et au début de la deuxième décennie - également dans les peuplements d'une grande partie des régions de plaine. Les hybrides de maïs plus précoces cultivés en conditions irriguées entreront en maturité laiteuse-pâteuse et en pleine maturité au cours de la première décennie. Les hybrides mi-tardifs achèveront leur développement dans la troisième décennie d'août.

En raison des conditions agrométéorologiques défavorables de la première moitié de l'été, avec une sécheresse prolongée et des températures extrêmement élevées, de faibles rendements de maïs et de tournesol sont attendus.

Les températures constamment élevées en juillet, qui se poursuivront en août, menacent sérieusement la récolte des cultures de printemps.

Le seul centre de sélection de tournesol du pays est l'Institut Agricole de la Dobroudja, où les efforts de sélection sont concentrés sur la création de nouvelles variétés de tournesol résistantes à l'orobanche, au mildiou et à la sécheresse. L'un des nouveaux hybrides de l'Institut – « Dara », adapté à la culture avec la technologie « Express » et résistant au mildiou jusqu'à la race 731 et à l'orobanche jusqu'à la race G, donne de très bons résultats dans des conditions de sécheresse et de températures élevées.

En août, des températures maximales comprises entre 35 et 40 °C sont prévues. Ces valeurs auront un impact négatif sur la floraison et la fécondation des cultures maraîchères de production tardive (concombres, haricots verts, courgettes).

Les conditions météorologiques au cours du mois limiteront le développement des maladies fongiques, à l'exception des oïdiums sur les cultures maraîchères, les arbres fruitiers et les vignes. Une augmentation des populations d'acariens est attendue. Dans les vignobles, il est nécessaire de surveiller la densité des chenilles de la troisième génération de l'eudémis. Si nécessaire, les traitements phytosanitaires en août doivent être effectués pendant les heures les plus fraîches de la journée (à des températures inférieures à 25 °C), en utilisant des produits avec une période de pré-récolte appropriée, conformément à la période de maturation des cultures.

Source : NIMH