

En septembre, aucune précipitation d'importance agricole n'est attendue, et les conditions permettront la formation d'un rendement supplémentaire pour les cultures légumières tardives.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.09.2025 *Брой:* 9/2025



En septembre, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par des températures supérieures aux normes climatiques et des précipitations autour et en dessous de la norme mensuelle.

Après l'aggravation de la sécheresse, les pluies de fin août ont été locales et ce n'est qu'à certains endroits des régions centrales et orientales qu'elles ont humidifié la couche supérieure du sol. Dans la plupart des régions arables, l'humidité productive est absente dans les couches de sol de 50 et 100 cm.

Au cours des première et deuxième décades de septembre, des précipitations d'importance agronomique ne sont pas prévues, et dans de nombreux endroits des régions arables, le sol sec et compacté entravera l'exécution des labours profonds et des travaux de pré-semis des parcelles destinées aux semis de colza. La probabilité de retards importants dans les semis de cette oléagineuse, qui exige une agrotechnique précise, est élevée. La période agrotechnique pour le semis du colza s'étend de fin août à la fin de la deuxième décade de septembre.



En septembre, les conditions thermiques supérieures à la normale prévues accéléreront les stades finaux de développement des cultures agricoles tardives qui ont surmonté les effets adverses de la sécheresse estivale prolongée. Au début du mois, les hybrides de maïs mi-tardifs cultivés en

conditions irriguées seront au stade pâteux et pleine maturité, tandis que les hybrides tardifs seront en transition du stade laiteux au stade pâteux.

La plupart des jours du mois, le temps relativement sec et chaud prévu pour la fin de l'été et le début de l'automne fournira des conditions propices à la récolte du raisin. En raison des températures estivales supérieures à la normale, les cépages de vin tardifs atteindront leur maturité technologique plus tôt que les dates habituelles.

Les conditions météorologiques de septembre limiteront le développement des maladies fongiques, à l'exception des oïdiums. Pour les cultures maraîchères de pleine terre tardives, les pulvérisations de protection des plantes contre les acariens, la teigne du chou et la noctuelle de la tomate, qui causent des dégâts et détériorent la qualité du rendement légumier, ne doivent pas être sous-estimées.

Au cours du mois, l'activité nuisible d'une grande partie des ravageurs sur les cultures fruitières prend fin. Fin septembre, il est conseillé d'inspecter les vergers de poiriers pour détecter la présence du charançon du bourgeon du poirier. La lutte contre ce ravageur n'est efficace que contre les adultes au début de l'automne. Lorsque la densité du ravageur dépasse le seuil économique de nuisibilité (3 charançons par arbre), un traitement doit être effectué.

En raison des températures estivales supérieures à la normale, certaines variétés d'arbres fruitiers d'automne précoce non affectées par les gelées printanières atteindront leur maturité de récolte (pommes : Golden Parmena, Jonathan, Red Delicious, Golden Delicious, Reinette du Canada, etc.).

En septembre, des températures minimales critiques ne sont pas prévues, et les conditions permettront la formation d'une production supplémentaire à partir de cultures maraîchères tardives sensibles au gel.