

Octobre – Anomalies Climatiques et un Démarrage Plus Tardif des Semis d'Automne de Céréales d'Hiver

Автор(и): Растителна защита

Дата: 12.10.2025 Брой: 10/2025



Durant les dix premiers jours d'octobre, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par un temps instable et des températures journalières moyennes autour et en dessous des normes climatiques. Durant cette période de dix jours, des températures minimales critiques pour les cultures maraîchères de production tardive ne sont pas prévues dans les zones de culture, ce qui est une condition préalable à la récolte de produits supplémentaires des cultures sensibles au gel (tomates, poivrons, courgettes, cornichons, etc.).

Durant cette période, des précipitations économiquement significatives sont prévues, améliorant l'état des couches supérieures du sol et les conditions pour effectuer les travaux de culture saisonniers du sol. La sécheresse de fin d'été et début d'automne dans de nombreuses régions du pays a entravé la préparation du sol avant le semis des zones destinées aux cultures d'automne.

Les fortes précipitations durant les dix premiers jours d'octobre, qui ont dépassé deux fois, et dans le nord de la Bulgarie – trois fois les normes climatiques en de nombreux endroits du pays : Lovech - 152 l/m² (296%), Pleven - 167l/m² (342%), V. Tarnovo - 187l/m² (351%), Razgrad - 171 l/m² (302%), Ruse - 254 l/m² (450%), ont saturé les couches supérieures du sol et augmenté les réserves d'humidité dans les couches de 50 et 100 cm.

Début des Semis d'Automne



Des conditions agrométéorologiques défavorables – la sécheresse et les précipitations excessives ultérieures durant les dix premiers jours d'octobre ont entravé les travaux de culture saisonniers du sol, et dans certaines régions du pays, comme la Bulgarie occidentale, le semis des céréales d'hiver est retardé, bien que le début officiel des semis d'automne ait déjà été donné.

Les dix premiers jours d'octobre sont la date limite agrotechnique pour le semis du blé dans le nord de la Bulgarie, du 15 au 25 octobre - dans le sud de la Bulgarie, et à la fin du mois - dans les régions côtières de la mer Noire. Selon les données du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, les semis de blé accusent un

retard de plus de 52%, avec moins de surfaces semées dans le pays par rapport à la même période l'année dernière. Un retard est également observé pour l'orge et le seigle, mais dans une moindre mesure.

Possibilités d'Utilisation et d'Application du Triticale

Selon les données du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, une augmentation significative des surfaces de triticale est observée lors de la campagne de semis d'automne de cette année – près de 54% de plus par rapport à l'année précédente. En 2024, les surfaces de cette culture étaient de 102 xa à cette période de l'année, tandis qu'actuellement, les champs semés en triticale représentent 167 xa.

L'intérêt pour cette culture, qui est un hybride intergénérique de blé et de seigle, a augmenté ces dernières années en raison de sa combinaison du potentiel de rendement élevé du blé et de la résistance aux maladies du seigle.



Une tendance connue d'augmentation des surfaces de colza a été observée au cours des dernières saisons. Cette année, la croissance de cette culture lors des semis d'automne est de 39% par rapport aux données de la campagne de l'année dernière. À ce jour, les champs semés en colza dépassent les 73,3 mille hectares.

Pendant la plupart des jours des deuxième et troisième décades, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par un temps relativement sec et des températures proches de la normale. Il y a une forte probabilité que les phases initiales de végétation pour les céréales d'hiver semées fin octobre se déroulent avec un déficit d'humidité. À la fin du mois, pour le blé et l'orge, selon les dates de semis, les phases de levée et de formation de 1-2 feuilles seront observées.

Pendant cette période, les conditions seront favorables pour achever la récolte du raisin, pour la récolte des variétés d'arbres fruitiers d'automne, et fin octobre – également pour la réalisation d'activités phytosanitaires. Pour les vergers de pommiers et de poiriers atteints de tavelure, afin de réduire l'infection, il est conseillé de traiter avec une solution d'urée à 5% au début de la chute des feuilles, après la récolte des fruits.

Pour les espèces de fruits à noyau, après la chute massive des feuilles, une pulvérisation avec un mélange bordelais à 2% est recommandée contre les agents responsables de la criblure, de la moniliose précoce, de la cloque du pêcher, etc.