

Dans la seconde moitié de novembre, il y aura des conditions pour la réalisation des activités agrotechniques saisonnières et la plantation d'arbres fruitiers

Автор(и): Растителна защита
Дата: 09.11.2025 Брой: 11/2025



Les conditions agrométéorologiques en novembre seront déterminées par des températures proches et supérieures aux normes climatiques, ainsi que par des précipitations autour et inférieures à la norme pour le mois.

D'ici la fin de la première et le début de la deuxième décade de novembre, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par un temps instable. Les précipitations de la fin de la période de sept jours écoulée et

celles attendues au cours de la prochaine retarderont encore, au-delà des délais agrotechniques, le semis du blé. Jusqu'à présent, environ la moitié des surfaces prévues ont été semées.

Les précipitations d'octobre, qui ont dépassé deux à trois fois les normes climatiques (Sofia, Pleven, Lovech, V. Tarnovo, Razgrad, Ruse, Pazardzhik, Stara Zagora, Burgas), ont maintenu une teneur élevée en humidité dans les couches superficielles du sol, ce qui a retardé la préparation du sol avant le semis et le semis des céréales d'hiver. Pour cette raison objective, dans la plupart des régions du pays, à l'exception de certaines zones de la plaine du Danube et des régions orientales, les délais agrotechniques pour le semis du blé en octobre n'ont pas été respectés. Une partie significative des surfaces prévues pour les céréales d'hiver sera semée en novembre. Il y a une forte probabilité que les cultures de novembre ne puissent pas atteindre la phase de tallage, phase propice à l'hivernage, d'ici la fin de leur végétation automnale.

Pendant la plupart des jours de novembre, des températures journalières moyennes supérieures à la normale sont prévues, ce qui maintiendra des processus de végétation actifs dans les cultures d'automne. À la fin du mois, différentes phases seront observées dans le blé et l'orge, en fonction des dates de semis. Pour les cultures semées en novembre, la germination et la formation des feuilles (1-2-3 feuilles) se produiront. Dans une petite partie des cultures de blé de certaines zones de la plaine du Danube et des régions orientales (Dobrich, General Toshevo, Tervel, Provadia, Karnobat), qui ont été semées au début de l'automne, le début de la phase de tallage sera observé.



Le ravageur le plus dangereux des cultures céréalières est le carabe céréaliier commun (Zabrus tenebrioides), qui attaque le blé, l'orge, le maïs, l'avoine et un certain nombre de graminées céréalières.

Dans les phases initiales de végétation du blé et de l'orge, les cultures doivent être surveillées pour détecter les ravageurs. Les dégâts sont causés par le campagnol commun, les larves du carabe céréaliier et les mouches des céréales, et si la densité est supérieure au seuil de nuisibilité économique (SNE), une protection phytosanitaire opportune est nécessaire.



En novembre, des conditions plus favorables à la plantation d'arbres fruitiers et à la réalisation d'activités phytosanitaires sur les cultures fruitières seront créées au cours de la deuxième décade. Pour les espèces de fruits à pépins (pomme, poire) affectées par la tavelure, un traitement avec une solution d'urée à 5% est recommandé. Pour les espèces de fruits à noyau, il est conseillé de pulvériser une bouillie bordelaise à 2% contre les agents responsables de la criblure, de la moniliose et de la cloque du pêcher.