

Décembre – températures anormalement élevées et précipitations localisées

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.12.2025 Брой: 12/2025



Le temps doux pour la saison pendant la majeure partie de novembre et la présence de très bonnes réserves d'humidité du sol ont créé des conditions favorables à la progression du développement des cultures d'automne semées tardivement, après les délais agro-techniques.

Au début de décembre, les températures prévues supérieures à la normale prolongeront les processus de végétation des céréales d'hiver dans les régions agricoles du pays.

Des précipitations généralisées au début de la période augmenteront le niveau des réserves d'humidité automnales dans la couche de sol de 100 cm. En raison des précipitations supérieures à la normale en octobre

et novembre, les réserves d'humidité du sol dans la couche d'un mètre pour les céréales d'hiver dans la plupart des régions agricoles ont atteint des niveaux allant jusqu'à 90 % de la CC (capacité au champ).

À la fin de la période décennale, les conditions agrométéorologiques continueront d'être déterminées par des températures élevées pour la saison. Dans les régions de l'Est, des valeurs maximales de plus de 14-15°C sont prévues, avec une probabilité de provoquer un gonflement indésirable et prématuré des bourgeons chez certaines espèces fruitières à floraison précoce, ce qui entraînerait une réduction de leur résistance au gel.

Des conditions favorables à l'achèvement des pulvérisations phytosanitaires automnales sur les arbres fruitiers contre les agents pathogènes et les ravageurs hivernants seront créées au cours de la seconde moitié de la première décade du mois.

Une baisse des températures, une atténuation et un arrêt de la végétation pour le blé et l'orge sont attendus à la fin de la première décade de décembre.

Pendant les deuxième et début de troisième décades, les températures moyennes journalières prévues dépasseront les normales climatiques mais resteront dans des limites qui maintiendront les céréales d'hiver en dormance.

Au début de l'hiver, le stade de la troisième feuille prédominera pour le blé. Une petite partie des cultures dans certaines régions de l'est et de l'extrême sud du pays, semées à temps – en octobre, seront en phase de tallage, propice à l'hivernage. Les céréales d'hiver semées tardivement, au cours de la seconde moitié de novembre, entreront l'hiver sous-développées, au stade initial de la formation des feuilles (1-2 feuilles). La raison des différences significatives dans l'état phénologique des cultures est le semis retardé en raison de conditions défavorables au début de l'automne – après la sécheresse et les précipitations d'octobre supérieures à la normale qui ont suivi.

Vers la fin de décembre, une augmentation des températures est attendue, mais leurs valeurs moyennes journalières resteront inférieures au minimum biologique requis pour la reprise des processus de végétation des cultures d'automne.

Au cours du mois, les températures minimales prévues, jusqu'à moins 10°C, dans des conditions sans couverture neigeuse, si elles se maintiennent pendant une période plus longue, seront critiques pour les cultures au stade initial de la formation des feuilles.

Les précipitations attendues en décembre, proches de la norme mensuelle, augmenteront les réserves d'humidité dans la couche de sol de 100 cm à des niveaux proches de la CC (capacité au champ).