

Kwelex® – un contrôle puissant contre les mauvaises herbes dicotylédones

Автор(и): Corteva Agriscience™
Дата: 03.02.2026 Брой: 2/2026



Pour la troisième saison consécutive, **Quelex®** de *Corteva Agriscience™* s'avère être la solution fiable pour la lutte contre les mauvaises herbes dicotylédones dans les cultures céréalières. Chaque année, de plus en plus d'agriculteurs choisissent Quelex® pour sa **haute efficacité, son excellente sélectivité et sa stabilité** sous diverses conditions météorologiques.

Lors des campagnes récentes, marquées par une météo variable et des situations de stress fréquentes pour les cultures, **Quelex® a montré des résultats constants** – même contre les adventices surdéveloppées, les fortes fluctuations de température et les sécheresses.

L'herbicide assure **un contrôle complet des mauvaises herbes dicotylédones**, y compris celles qui ont développé une résistance aux herbicides traditionnels. Parmi elles, on trouve le **coquelicot (Papaver rhoeas)**, la **lamier pourpre (Lamium purpureum)**, le **pied-d'alouette des champs (Delphinium consolida)** et le **gaillet gratteron (Galium aparine)** – certaines des adventices les plus communes et économiquement significatives dans les cultures céréalières.

La substance active unique **Arylex™ Active**, faisant partie du nouveau groupe chimique des *arylpicolinates*, offre un mode d'action différent, grâce auquel Quelex® contrôle efficacement même les espèces résistantes.

Le produit peut être appliqué **aussi bien en automne qu'au printemps**, à une dose de **5 g/da**, garantissant une pleine efficacité à des températures comprises entre **+5°C et +27°C**. Le traitement peut être réalisé **de la première feuille à la dernière feuille étalée** – une flexibilité qui permet aux agriculteurs de réagir en fonction de la situation réelle au champ.

Les premiers signes d'action sont observés **quelques heures seulement après l'application**, lorsque les adventices commencent à présenter des déformations épïnastiques et arrêtent leur croissance. L'éradication complète intervient en **2 à 4 semaines**, période durant laquelle elles cessent d'être compétitives avec la culture.

Pour obtenir un effet maximal sous une forte pression des adventices, l'ajout de l'adjuvant **Vivol™** est recommandé, car il assure une meilleure couverture et pénétration de la substance active.

Quelex® est plus qu'un herbicide – c'est une **fiabilité et une efficacité en conditions réelles**, prouvées en pratique depuis plus de trois saisons dans les champs bulgares.

Quelex® – un partenaire éprouvé et flexible pour des cultures propres et la tranquillité au champ.