

Boxeur Evo : un départ propre pour les céréales

syngenta, България

Date 21.09.2026 | Numéro 9/2026 | ISSN 2815-522X | Langue FR

www.plant-protection.com/article/2470?lang=fr



Boxer Evo est le nouvel herbicide de Syngenta, développé en réponse à l'un des principaux défis des cultures céréalières : l'infestation par les mauvaises herbes. Le produit combine deux substances actives, le prosulfocarbe et le diflufénican, avec une forte synergie entre elles, ce qui assure un désherbage fiable et à large spectre.

Appliqué en pré-levée ou en post-levée précoce (automne), Boxer Evo élimine la concurrence des mauvaises herbes dès le départ et offre au blé, à l'orge, au seigle et au triticale un départ propre et de bonnes conditions de développement.

Principaux avantages :

Contrôle précoce très efficace d'un large spectre de graminées et de dicotylédones adventices

Excellent contrôle des graminées difficiles : ivraie, folle avoine, brome, sétaire, pâturin annuel (pré- et post-levée)

Efficacité fiable contre les dicotylédones : véronique de Perse, pensée sauvage, gaillet gratteron, matricaire, bleuet et autres

Deux modes d'action différents pour une efficacité supérieure et un contrôle durable

Excellent partenaire pour la gestion des résistances, y compris dans les populations difficiles à contrôler

Boxer Evo est la fondation sur laquelle les agriculteurs peuvent bâtir.

Mode d'action

Boxer Evo combine deux substances actives avec deux modes d'action différents :

Le prosulfocarbe inhibe la division cellulaire ainsi que la levée et le développement des mauvaises herbes. Il est absorbé principalement par le système racinaire des plantes, l'effet principal se produisant lors de l'absorption par l'hypocotyle. Il est prélevé du sol par les racines.

Le diflufénican perturbe la synthèse des caroténoïdes, provoquant la dégradation de la chlorophylle.

La combinaison de deux modes d'action différents assure une efficacité supérieure et est essentielle pour une gestion durable des résistances.

Technologie intégrée pour la gestion des formes résistantes d'ivraie

Contrôle à deux moments clés du développement des cultures céréalières :

Automne, Boxer Evo : 300 ml/ha, en pré-levée ou post-levée (1re-2e feuille)

Printemps, Avoxa : 160-180 ml/ha

Avantages du traitement d'automne : élimination des mauvaises herbes en germination et en levée à l'automne, réduction du stock semencier de mauvaises herbes dans le sol, création de conditions pour un départ propre et un bon développement des plantes cultivées.

Avantages du traitement de printemps : élimination de la concurrence des mauvaises herbes en levée, réduction de l'effet négatif de la concurrence, préservation du potentiel de rendement par unité de surface.

Deux modes d'action différents à deux moments clés signifient une efficacité supérieure et une densité d'infestation par les mauvaises herbes réduite.

Homologué pour : blé, orge, seigle, triticales

Période d'application selon le BBCH

Application au sol ou en végétation précoce au stade BBCH 00-09 (pré-levée) ou BBCH 10-13 (1re-2e feuille), dose de 300 ml/ha.

Efficacité prouvée dans les champs d'essai de Syngenta Bulgarie

Résultats d'applications au sol et en végétation précoce lors de la saison 2024-2025 dans le centre-sud de la Bulgarie (village d'Otets Kirilovo) et le nord-est de la Bulgarie (ville de Popovo), avec une efficacité clairement exprimée par rapport au témoin non traité.

Recommandations d'application

Au sol ou en végétation précoce (1re-2e feuille)

Dose d'application : **300 ml/ha**

Volume d'eau : **16-30 l/ha**

En savoir plus sur [Boxer Evo](#) de Syngenta !