

En octobre : Quelles seront les conditions agrométéorologiques et quelles sont les dates optimales de semis

Растителна Защита

Date 09.10.2026 | Numéro 10/2026 | ISSN 2815-522X | Langue FR

www.plant-protection.com/article/2478?lang=fr



Durant les dix premiers jours d'octobre, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par un temps instable et des températures moyennes quotidiennes proches et inférieures aux normes climatiques. Le temps frais et humide prévu la plupart des jours de cette période sera une condition préalable au développement d'agents pathogènes - la pourriture brune tardive sur les fruits des variétés d'automne des arbres fruitiers (*Monilia fructigena*), la pourriture grise (*Botrytis cinerea*) sur la récolte de raisins non récoltée. Des gelées massives sont attendues à la fin de la décade, ce qui nécessite une récolte en temps opportun des cultures maraîchères sujettes au gel.



*Pourriture brune tardive sur les fruits des variétés d'automne des arbres fruitiers (*Monilia fructigena*)*

Durant les dix premiers jours d'octobre, des précipitations sont prévues, une amélioration de l'état des couches supérieures du sol et des conditions pour la réalisation des travaux saisonniers du sol. La sécheresse à la fin de l'été a entravé la réalisation des travaux du sol avant semis des surfaces destinées à

l'ensemencement en cultures d'hiver. Pour cette raison, les délais agrotechniques de septembre pour le semis du colza d'hiver ont été manqués.



Octobre est la période optimale pour le semis des céréales d'hiver. Durant les dix premiers jours se situe le délai agrotechnique pour le semis du blé dans le nord de la Bulgarie, du 15 au 25 octobre - dans le sud de la Bulgarie, et à la fin du mois – dans les zones le long de la côte de la mer Noire.

Les conditions agrométéorologiques durant la période du 9 au 16 octobre seront dynamiques. Au début de cette période de sept jours, les températures moyennes quotidiennes prévues seront supérieures à la normale, et durant le reste de celle-ci elles seront dans les normes climatiques. Au début de la période, des précipitations locales et légères sont prévues dans l'ouest de la Bulgarie, et vers le milieu également dans les zones de plaine du centre et de l'est de la Bulgarie. Par endroits, les quantités seront importantes, ce qui améliorera l'humidification des couches supérieures du sol. Des conditions pour la formation de gelées ne sont pas attendues.

À l'exception de certaines zones de l'ouest de la Bulgarie, durant la première moitié de la période de prévision, les conditions agrométéorologiques seront propices à la récolte finale des plantations de raisins et de fruits, au nettoyage des zones des cultures en lignes et des légumes tardifs, ainsi qu'à l'arrachage des fourrages et de la betterave sucrière, qui sont en phase de maturité technologique. Les conditions seront propices à la réalisation des activités agrotechniques liées au semis des céréales d'hiver. En cas d'infestation importante par les mauvaises herbes des zones, il est conseillé de procéder à une application automnale d'herbicides.



Jusqu'au milieu de la période, les conditions agrométéorologiques permettront l'application d'engrais minéraux et organiques, ainsi que la plantation avant l'hiver d'oignons pour la verdure, d'ail d'hiver, de laitue et d'épinards.

Les pluies attendues durant la seconde moitié de la période de prévision limiteront considérablement les possibilités de réalisation des activités agricoles.

Durant les deuxième et troisième décades, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par des températures proches des habituelles. Les précipitations attendues durant la première moitié de la deuxième décade, au début de la troisième et à la fin du mois, amélioreront les réserves d'humidité du sol dans la couche de 50 cm et les conditions pour le déroulement des phases initiales de la végétation des cultures d'hiver semées. À la fin d'octobre, dans le blé et l'orge, selon les dates de semis, les phases de levée et de formation de 1-2-3 feuilles seront observées.



En octobre, les cultures d'automne sont attaquées par des ravageurs. Dans les céréales d'hiver, la présence du campagnol commun, du carabe du blé et des mouches du blé doit être surveillée. Lorsque le

nombre de ravageurs dépasse le seuil économique de nuisibilité (SEN), un traitement en temps opportun est nécessaire. Pour le campagnol commun, le SEN

est de 2 colonies actives par décare, pour le carabe commun du blé - 3 larves/m².