

Températures minimales critiques pour les cultures fruitières dans la première quinzaine d'avril

Автор(и): Растителна защита

Дата: 04.04.2017 Брой: 4/2017



Début du mois, une probabilité accrue est prévue pour des températures minimales négatives et des valeurs critiques (inférieures à moins 2°C) pour la floraison et la nouaison des arbres fruitiers. Durant cette période, les cultures céréalières d'hiver entreront dans le début du stade de montaison. Dans les peuplements de colza d'hiver ayant bien hiverné, le stade du bourgeonnement aura lieu.

Début avril, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par un temps relativement sec. Les conditions seront propices à la réalisation des activités agrotechniques saisonnières, dont la plus importante est

le semis du tournesol. Dans de nombreux endroits du sud de la Bulgarie, les périodes optimales pour le semis du tournesol, dans la seconde moitié de mars, ont été manquées. Pour le nord de la Bulgarie, ces périodes se situent dans la première décade d'avril.

Durant la première décade, la végétation des cultures agricoles se déroulera à un rythme modéré, avec des températures quotidiennes moyennes proches des normes climatiques. Début du mois, une probabilité accrue est prévue pour des températures minimales négatives et des valeurs critiques (inférieures à moins 2°C) pour la floraison et la nouaison des arbres fruitiers. Durant cette période, les cultures céréalières d'hiver entreront dans le début du stade de montaison. Dans les peuplements de colza d'hiver ayant bien hiverné, le stade du bourgeonnement aura lieu.

Durant la première moitié de la seconde décade, une augmentation substantielle des températures et un développement accéléré des cultures semées à l'automne et des plantations pérennes sont attendus. Mi-avril, le blé et l'orge seront principalement au stade de montaison. En fin de période, dans une partie des peuplements de colza, le début du stade de floraison sera observé. Dans le tournesol semé fin mars, le stade de levée prédominera.

Durant la période suivante, les précipitations attendues fourniront l'humidité nécessaire au déroulement normal de la végétation dans les cultures semées à l'automne et dans les cultures de printemps précoces et mi-précoces. Au début du printemps, les réserves en eau du sol dans les couches de 50 cm et 100 cm dans la majeure partie du pays sont très bonnes, supérieures à 90% de la capacité au champ (CC). Des exceptions se produisent par endroits dans la plaine du Danube (stations agrométéorologiques de Kneja, Novachene) et dans les vallées sub-balkaniques (Kazanlak), où le niveau des réserves en eau est plus faible (inférieur à 80% de la CC).

Durant la période, des conditions plus propices à la réalisation de traitements phytosanitaires contre certaines maladies économiquement importantes (flétrissure des fleurs, cloque du pêcher, criblure, tavelure, chute des jeunes fruits du cognassier, etc.) et ravageurs (mineuses, pucerons, papillons de nuit, charançons, etc.) se présenteront au début et à la fin de la première et au milieu de la seconde décade d'avril.

Source : NIMH-BAS