

Durant la première quinzaine de mai, des conditions favorables au développement du fond infectieux de plusieurs maladies fongiques dans les cultures agricoles seront présentes.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.05.2017 Брой: 5/2017



Des précipitations fréquentes et localement intenses début mai constitueront une condition préalable à une augmentation de la pression infectieuse de plusieurs maladies fongiques : la fusariose et les rouilles (jaune, brune) sur le blé et l'orge ; les mildious sur les cultures maraîchères ; la tavelure et la criblure sur les arbres fruitiers ; le mildiou et l'oïdium sur la vigne.

Au cours de la première décade de mai, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par un temps instable avec des averses fréquentes, qui dans de nombreuses régions du pays entraveront la mise en œuvre

des activités agrotechniques saisonnières – achèvement des semis de maïs grain, travail du sol avant semis et semis des cultures thermophiles de printemps tardives – haricots, coton, arachides, pastèques, melons, etc.

Durant cette période, le développement des peuplements semés à l'automne et des cultures de printemps semées se déroulera sous des températures moyennes journalières proches des normes climatiques et en présence de bonnes réserves d'humidité du sol dans la couche de 50 cm, supérieures à 85% de la capacité au champ (CC). Au cours de la décade, dans les régions de plaine du pays, le stade de l'épiaison sera observé à grande échelle sur le blé et l'orge, et dans certains endroits du sud de la Bulgarie – le début de la floraison.

À la fin de la première et au début de la deuxième décade, une hausse des températures et une accélération de la végétation des cultures agricoles sont prévues. D'ici la mi-mai, la floraison et la fécondation auront lieu dans les céréales d'hiver, et dans le maïs et le tournesol – la formation des feuilles. Dans les cultures de printemps précoces (vesce, pois), le bourgeonnement et la floraison seront observés.

Dans les cultures fruitières non touchées par les gelées d'avril, la formation et l'élargissement de la nouaison auront lieu. Sur la vigne, l'émergence des inflorescences sera observée.

Des précipitations fréquentes et localement intenses début mai constitueront une condition préalable à une augmentation de la pression infectieuse de plusieurs maladies fongiques : la fusariose et les rouilles (jaune, brune) sur le blé et l'orge ; les mildious sur les cultures maraîchères ; la tavelure et la criblure sur les arbres fruitiers ; le mildiou et l'oïdium sur la vigne. Des conditions plus favorables pour réaliser les traitements phytosanitaires se présenteront à la fin de la première et dans la première moitié de la deuxième décade.

D'ici la mi-mai, aucun minimum critique de températures pour les cultures agricoles n'est prévu. Durant la première décade, une probabilité accrue de grêle est attendue. En cas de dégâts dus à la grêle, il est conseillé de traiter les cultures affectées dès que possible avec des fongicides à base de cuivre pour une cicatrisation plus rapide des blessures et pour réduire le risque d'infections secondaires.

Source : NIMH-BAS