

Manna sur la vigne (*Plasmopara viticola*)

Автор(и): Растителна защита
Дата: 08.05.2017 Брой: 5/2017



Selon l'âge des feuilles, le mildiou forme deux types de taches : huileuses et en mosaïque. Sur leur face inférieure se forme un feutrage blanc de sporulation. En cas d'attaque sévère, les feuilles se dessèchent et tombent prématurément. Dans des conditions favorables (humidité relative de l'air supérieure à 75 %), des taches chlorotiques apparaissent sur les inflorescences et les grappes, sur lesquelles un feutrage blanc de sporulation se forme également. Lorsque les taches sont à la base de la grappe, toute la grappe se dessèche. L'infection des baies cesse lorsque, pour les cépages de cuve, elles atteignent la taille d'un « pois », et pour les cépages de table la taille d'un « haricot ».

Stratégie de lutte contre le ravageur :

Le traitement est effectué lorsque des conditions favorables à l'infection se présentent (température de l'air supérieure à 13°C et pluies fréquentes mais légères) et pendant le stade phénologique sensible de la vigne « floraison » - « pois ».

Produits phytosanitaires autorisés :

acrobate r – 0,25 % ; acrobate plus wg – 200 g/ha ; axanit-cu wp – 0,25 % ; alial 80 wg - 75-330 g/ha ; alfil wg - 0,075-0,33 kg/ha ; alfil wp - 0,075-0,33 kg/ha ; alfil duplo - 90-350 g/ha ; amalin flo - 280 ml/ha ; anthracol 70 wg – 0,15 % ; armetil m – 0,25 % ; armetil-s wp – 0,25 % ; banko 500 – 0,2 % ; bordeaux mix 20 wp – 0,5-0,6 % ; valbon - 180-200 / ha ; verita wg – 0,2 % ; winker wg – 200 g/ha ; vitene triplo r - 400 -450 g/ha ; vitra 50 wp /cuprohy 50 wp – 0,15 % ; galben 8 m 65 – 0,25 % ; delan 700 wdg – 0,05 % ; dimix 500 sc - 34 ml/ha appliqué en mélange en cuve avec des produits contenant du folpet ; dimix 500 sc - 30 ml/ha appliqué en mélange en cuve avec des produits contenant du mancozèbe ; ditan dg - 200 g/ha ; ditan m-45 - 200 g/ha ; drago 76 wp – 0,16 % ; enervin – 0,2 % ; cabrio top – 0,15- % – intervalle de traitement 7-10 jours - 0,2 % tous les 10-14 jours ; katanga express - 75-330 g/ha ; katanga man - 300-500 g/100 l d'eau ; corseit r df – 0,25 % ; corseit r wp – 0,25 % jusqu'au 09.2017 ; corseit max wp – 0,15 % ; cuadris 25 sc – 0,075 % ; cupertine m – 0,3 % ; cuproxat fl / tribase flowable – 0,3 % jusqu'au 06.2017 ; cuproset gold m – 0,15 % ; cuprocine super m – 0,2 % ; lieto - 40-45 g/ha ; mancozèbe 80 wp – 0,3 % ; manfil 80 wp - 200 g/ha ; manfil 75 wg - 210 g/ha ; medeiro 80 wg- 75-330 g/ha ; oxychlorure de cuivre 50 wp – 0,25 % ; medyan extra 350 sc - 350 ml/ha ; melody compact 49 wg - 150 -175 g/ha jusqu'au 06.2017 ; mical flash – 0,3 % ; mildicut - 350-450 ml/ha ; moximat 505 wg - 240-300 g/ha ; moximat 505 wp - 240 – 300 g/ha ; momentum extra wg - 300 g/ha ; pasodoble 70 wg - 200 g/ha ; pencozeb 80 wp - 200 g/ha ; pencozeb 75 wg - 210 g/ha ; pergado copper 27 wg - 500 g/ha ; pergado f 45 wg – 0,2 % ; profiler 71.1 wg- 200-225 g/ha ; ridomil gold mz 68 wg – 0,25 % ; rumba 35 sc – 0,35 % ; sancozeb 80 wp - 200 g/ha ; sinstar - 70-80 ml/ha ; solofol - 188 g/ha ; strobilurin df /discus df - 0,015 % +acrobate mz - 0,15 % ; sphinx extra /vinostar - 180 g/ha ; folder 80 wg - 150 g/ha ; follow 80 wg/ friller 80 wg/ flowet 80 wg - 187,5 g/ha ; folpan 80 wdg - 0,15 % - 0,1 % +ardent 50 sc - 0,015 % ; funguran oh 50 wp – 0,15 % ; shavit f 72 wdg – 0,2 % ; champion wp/ makk 50 wp /champ wp – 0,155.