

Ravageur dangereux « dévaste » les buis

Автор(и): Растителна защита
Дата: 19.05.2017 Брой: 5/2017



Si vous remarquez que le buis jaunit, vous êtes certainement confronté à un problème sérieux. Il a été infesté par la pyrale du buis (Cydalima perspectalis). Ce ravageur dangereux, originaire d'Asie de l'Est, est entré en Europe en 2007 et s'est très rapidement implanté dans divers pays – Italie, Russie, République tchèque, Hongrie, Suisse, Autriche, Belgique, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, France, Turquie et Royaume-Uni, y compris la Bulgarie.

Elle se propage par le matériel de plantation, mais même si votre buis est dans votre jardin depuis longtemps, ce n'est pas une garantie qu'il ne sera pas "visité" par ce ravageur. La raison en est que le papillon est capable de voler sur de longues distances – 10 km ne sont pas un obstacle pour lui. On considère que le commerce de matériel de plantation sur Internet est l'une des voies d'introduction du ravageur en Europe.

Le ravageur est un papillon, généralement blanc, brillant, avec une bande brun foncé le long du bord des ailes. Lorsque les ailes sont déployées, sa taille est de 4 cm. Les larves sont vert clair avec des marques noires caractéristiques et des points blancs, avec de petits poils et une tête noire brillante.

Les dégâts sont causés par la larve. Elle se nourrit des feuilles du buis, d'abord sur les bords, puis les détruit complètement. Au début, les dégâts sont visibles sous forme de taches sur les feuilles. Détecter les jeunes larves est assez difficile, car elles se nourrissent entre les feuilles. Il est donc nécessaire d'ouvrir les arbustes et de chercher les larves au centre. Après le troisième stade, elles se déplacent également sur les feuilles de la partie supérieure du buis et peuvent être remarquées plus facilement. Les chrysalides sont difficiles à détecter (vert clair au début), car elles sont cachées entre les feuilles. Les œufs sont pondus en grappes, de 1 à 3 mm de taille, et sont recouverts d'une membrane transparente blanc-jaunâtre. Pendant la journée, les papillons se cachent dans le buis ou dans les plantes situées à proximité.

Lutte mécanique

Une mesure de lutte efficace est la collecte manuelle des larves, qui doit être effectuée tous les 2-3 jours. Pour les plantations plus importantes : allées, parcs, des aspirateurs peuvent également être utilisés. La pyrale du buis est attirée par les lampes ultraviolettes – celles que l'on place dans les jardins pour lutter contre les moustiques.

Lutte chimique

L'utilisation d'insecticides de contact (Decis 100 EC) est efficace, mais elle n'est pas adaptée aux parcs et jardins publics. Les bio-insecticides à base de *Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki* ont une bonne efficacité et sont respectueux de l'environnement. Vous pouvez également essayer le Prev-Gold (huile d'orange), qui est adapté à l'agriculture biologique.