

En juin, les conditions météorologiques seront favorables au développement des maladies fongiques.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 05.06.2017 Брой: 6/2017



En juin, les conditions météorologiques seront favorables au développement d'un certain nombre de maladies fongiques : le mildiou sur la vigne et les cultures maraîchères, la pourriture brune tardive sur les fruits des variétés tardives de cerisiers, la fissuration des fruits dans les vergers, etc. Des conditions plus propices à la réalisation des traitements phytosanitaires interviendront au début de la première, durant la seconde moitié de la deuxième, et la plupart des jours de la troisième décade du mois. Au cours du mois, les températures maximales prévues, autour de 34-35°C, auront un impact négatif sur la floraison et la fécondation des cultures maraîchères.

Au début du mois de juin, le développement des cultures agricoles se poursuivra à un rythme accéléré, sous des températures supérieures à la normale et, dans la majeure partie du pays, avec des réserves en eau du sol bonnes à très bonnes suite aux précipitations significatives de la troisième décade de mai (Vratsa – 57 l/m², Lovech – 41 l/m², Pleven - 106 l/m², Veliko Tarnovo - 74 l/m², Svishtov – 68 l/m², Ruse – 51 l/m², Silistra – 48 l/m²). Des exceptions seront observées uniquement dans des endroits isolés des régions du sud et du sud-est, où les précipitations n'ont pas eu d'importance économique particulière, inférieures à 10 l/m².

Au milieu de la première décade, une baisse et une normalisation des températures ainsi qu'un changement des conditions agrométéorologiques sont prévus. Les précipitations attendues d'ici la fin de la première décade maintiendront les réserves en eau du sol dans des fourchettes optimales pour la végétation des cultures de printemps. Elles auront également un effet bénéfique sur les cultures céréalières d'hiver dans les champs en altitude, où le remplissage des grains sera en cours. Pour le blé dans les régions de plaine du pays, le stade de la maturité laiteuse sera observé. Pour l'orge, la transition de la maturité laiteuse à la maturité pâteuse puis à la maturité cireuse aura lieu. Durant la première décade, le colza entrera en phase de maturation. Durant cette période, une probabilité accrue de grêle est prévue, avec un risque de verse des cultures et de dégâts supplémentaires sur les cultures agricoles. En cas de dégâts de grêle, il est recommandé de traiter les cultures maraîchères et fruitières affectées à la première occasion avec des fongicides appropriés (à base de cuivre).

Durant la plupart des jours des deuxième et troisième décades, le développement des cultures agricoles se poursuivra sous des températures proches de la normale. Au début de la deuxième décade, dans les zones de plaine, l'orge sera principalement au stade de la maturation massive. À la fin de la décade, le blé sera principalement au stade de la maturité cireuse.

D'ici la fin juin, une partie des cultures de printemps entrera dans des stades reproductifs de son développement : pour le tournesol, le début de la floraison sera observé, et pour les hybrides précoces de maïs – l'épiaison et la floraison de la panicule. Au cours du mois, les températures maximales prévues, autour de 34-35°C, auront un impact négatif sur la floraison et la fécondation des cultures maraîchères.

Source : NIMH - BAS