

Temps de la récolte

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.07.2017 Брой: 7/2017



Après les vagues de chaleur de juin, une normalisation des conditions thermiques est attendue au cours des dix premiers jours de juillet. Les précipitations prévues en début de mois amélioreront les conditions pour la végétation des cultures de printemps, dont une grande partie entrera dans les phases reproductives de leur développement. Au cours du mois, les températures maximales extrêmement élevées prévues, comprises entre 38 et 42°C, combinées à une faible humidité atmosphérique, auront un impact négatif sur la floraison et la fécondation du tournesol, du maïs et des cultures maraîchères (tomates, concombres, poivrons, courgettes).

En juillet, le développement des cultures agricoles se poursuivra à des températures proches ou supérieures aux normes climatiques, et dans de nombreux endroits des zones de plaine – dans des conditions de déficit hydrique du sol. **Le temps sec prévu pendant la plupart des jours du mois nécessitera la mise en place**

d'un régime d'irrigation approprié pour les cultures de printemps, avec des doses d'irrigation accrues dans les régions du nord-ouest et du sud du pays, où les réserves en eau du sol dans la couche de 50 cm au début de l'été sont faibles - inférieures à 50-55% de la capacité au champ (CC).

Après les vagues de chaleur de juin, une normalisation des conditions thermiques est attendue au cours des dix premiers jours de juillet. Les précipitations prévues en début de mois amélioreront les conditions pour la végétation des cultures de printemps, dont une grande partie entrera dans les phases reproductives de leur développement.

Au cours des première et deuxième décades, les phases suivantes se produiront chez le maïs : épiaison, floraison de la panicule et apparition des soies. Au cours de la troisième décade, certains des hybrides de maïs précoces dans les zones de plein champ entreront en phase de maturité laiteuse.

En juillet, le tournesol connaîtra la floraison, la fécondation et le remplissage des grains. À la fin du mois, dans certains peuplements de la plaine du Danube et dans les régions les plus orientales et méridionales, le début du stade de maturation sera observé. Au cours de la troisième décade, les fèves dans les zones de plaine achèveront leur développement.

Au cours du mois, les températures maximales extrêmement élevées prévues, comprises entre 38 et 42°C, combinées à une faible humidité atmosphérique, auront un impact négatif sur la floraison et la fécondation du tournesol, du maïs et des cultures maraîchères (tomates, concombres, poivrons, courgettes).

Les conditions agrométéorologiques en juillet limiteront le développement d'un certain nombre de maladies fongiques dans les cultures agricoles, à l'exception des oïdiums. Le temps sec et chaud sera un facteur propice à l'augmentation de la population de certains ravageurs - les acariens. Dans les cultures fruitières, l'activité nuisible de la deuxième génération de carpocapses ne doit pas être sous-estimée. Au cours du mois, les traitements phytosanitaires devront être effectués pendant les heures les plus fraîches de la journée. Une probabilité accrue de grêle est prévue pour juillet. En cas de dégâts de grêle, il est conseillé de traiter les cultures fruitières et maraîchères affectées dès que possible avec des fongicides à base de cuivre appropriés.

Des conditions plus favorables pour la réalisation de l'activité saisonnière la plus importante – la récolte du blé – se produiront au milieu de la première décade, dans la première moitié de la deuxième, et pendant la plupart des jours de la troisième décade. Un bon rendement en grains est attendu.

Source : NIMH-BAS